

面產生很多小黑色具粘性的孢子堆。
健全組織的邊緣常呈黃灰色。

防治法：同蒂腐病。

果頂腐敗病

病徵為水浸狀圓型病斑，由果頂部出現，慢慢向果柄部位進展。最後在腐爛果皮上生出很多小的白或淡褐色孢子腔。

孢子腔常很多個聚集在一起，並由腔口溢出粉紅色孢子堆。

防治法：同蒂腐病。

褐腐病

病菌可由果實任何部位侵入，病斑開始時呈褐色約 1~1.5 英寸，病斑逐漸擴大而下陷，周緣呈水浸狀並稍突起，上面常可看到少數菌絲。

最後在病斑上形成小型孢子腔，並可由腔口溢出乳白色腔孢子。



番石榴- 檳榔 (翁慎微)

本病原菌只為害果實部分，不為害其他部位。

防治法：同蒂腐病。

軟腐病

此病菌只為害收穫後的果實，

病斑開始時呈圓型，水浸狀，病勢進展後，果實表面覆蓋着粗大菌絲，最後整個果實變成軟腐，並流出很多水汁。

防治法：同蒂腐病。



樂敏牌

ロビン
エンジン

農業、産業機械之動力源

●強力●輕便●省油●耐用


製造元：富士重工業株式会社

經銷處：樂敏有限公司

台北市康定路18號4樓

TEL.3610740•3612045•3613541~3

汽油、柴油 二衝程・四衝程
一馬力至二十馬力各馬力齊全



EY18-3B

兼售ROBIN汽油引擎發電機
RG10C・RG17D・RG25D・RG33D・RG50