



仙丹花 (林吉郎)

仙丹花 壯觀華麗

■■■ 林 雄

仙丹花在台灣已有三百多年栽培歷史，並普遍分布全省各地。為茜草科常綠小灌木，株高2~3公尺。葉對生，柄甚短，革質平滑無毛，長橢圓形，四季開花，而以春、夏盛開。着花頂生為聚繖花序，花冠細長筒狀，先端分為四裂。花色有白、桃、橙黃、赤等富於變化。盛花滿樹時，壯觀華麗。

仙丹花又名賣子木（唐本草）、買子木（本草綱目釋名）。所謂山丹花或三段花均為日名。學名：*Ixora Chinensis* Lam. 屬名由印度神名而來，種名為中國產的意思。茲將常見品種簡介如下——

白仙丹 (*I. Parviflora* Vahl.)：原產緬甸、印度，性狀與中國原產同樣，但樹形較為疏大，分枝力略差。

葉有柄，長橢圓形，長13公分，寬4公分。嫩枝幼葉柄均呈淡紅色。花頂生，繖形花序，集合而開，狀似球形，略具香氣。花期盛開於3~5月，過冬溫度約10°C。

爪哇仙丹 (*I. Javanica* Dc.)：爪哇原產，樹性、形態等皆似前種，惟樹株高度較大，可達4公尺以上。枝條呈赤色。葉對生，卵狀橢圓形，大而全緣，尖頭。花為濃橙赤色，長花筒，着生如前種。花期盛開於6~8月。

黃花仙丹 (*I. Lutea* Hutchinson.)：園藝種，花色淡黃，着花疏生。

球狀仙丹 (*I. Ambonica* Dc.)：摩路加羣島原產，花色橙黃，花序球形。

赤花仙丹 (*I. Coccinea* L.)：東印度原產，花色濃暗緋紅，花形特大。

香仙丹 (*I. Odorata* Hook.)：馬拉加西原產，花白色而後成為黃褐色，芳香強烈。

生育和開花：生育適溫為28°C左右，花芽分化條件雖不甚詳細，但以熟枝在12月花芽所見，可能是由於短日、低溫、乾燥等各種環境因素，抑制營養生長，而引起花芽的分化。

事實上以一般栽培而言，12月下旬如無充分的低溫，則開花不甚順利，可知需要有不為害葉片的低溫（5°C前後）。至於開花必要有高溫和高日，所以入春後夜溫如達10°C以上，開花便很順利。

繁殖和育苗：20°C的溫度下，任何時期都可行挿木繁殖。如要在次年春天開花，應行1~3月挿木；5~6月以後開花，應以自然溫度上升的5月為宜。挿穗選前年生長的半熟程度枝莖。頂芽挿宜帶4~6葉剪切，莖挿容易發芽。

頂芽挿穗的葉片要剪除剩為半葉，而後充分浸水保鮮才行沙挿或土挿，注意勿乾燥，在遮日下管理。如保持20°C適溫，約20~30天發根。

發根後根部包以水苔，假植淺箱，以防傷根，又可養成苗木的生長整齊。包水苔箱植約經50~60天管理，其間施用液肥2~3次，促進苗木生育。如為盆栽時，可省去包水苔的箱植。

盆栽用土為粘質田土60%，腐葉土或腐熟的稻草堆肥40%混合。上盆後約1個月，施行摘心1~2次，最終摘心應於8月下旬為限。

管理要點：高溫期濕度越高生育越順調。盆栽土壤過乾傷根，即難回復，所以應注意灌水。

入秋後枝條如未充實，便難分化花芽，所以在秋前的高溫期中，必需施用液肥加強肥培。

9月以後至10月初，宜有充足的日照，促使植株的充實，則着花容易。

冬天氣溫降至8°C以下時，要採防寒措施，然在本省的氣候下，過冬堪稱十分安全。

矮化劑處理：於10月中至11月，利用矮化劑（外國製品名B-ナイン，在本省多被譯成「B-9」）以400倍液，散布頂芽，不久梢端各節短縮，發生多數側枝各着花芽，至發蕾便形成圓滿美妙的盆株。

病虫害防治：病害很少發生，介殼虫最常見。一旦發現枝葉有幼虫存在，立即使用大滅速或賽福施噴防治。