



武田藥品

最低毒，最安全，最廣效
使用方法最簡便的殺蟲劑

培丹 パダン 粒劑

■特 性：

1. 使用培丹粒劑，對水稻一般害蟲，如二化螟蟲、縱捲葉蟲、稻苞蟲、黑尾浮塵子等，效果特佳。
2. 秧苗使用本劑，可使移植本田50天內不必使用其他殺蟲劑，並可防止黃萎病之發生。

■使用方法：

1. 本劑用於秧田或育苗箱時，在移植前只使用一次。
2. 撒佈後須用手掃一下，使粒劑落入地面，以便夾帶進入本田。
3. 使用後應立即移植插秧。
4. 插秧後隨即灌水2~3公分，保持3~5天。
5. 育苗箱每箱約50~70公克，秧田約兩分地一包。
6. 若用於本田，每公頃用30kg。

維利黴素 バリダシン

液劑

■特 性：

1. 能迅速切斷水稻紋枯病病原菌之生育，使其喪失感染作用。
2. 本劑一旦接觸病原菌時即迅速發生作用，並波及全部菌絲使其喪失病原性。
3. 耐洗性高，故受下雨之影響很小，遇雨倒伏，並可抑制新穗發芽。
4. 絕無藥害，並能提高米質，增加產量。

■正確使用方法：

1. 以噴霧器均勻散布於稻株及葉鞘。
2. 使用時稀釋500~1000倍。
3. 每分地用130~150公升稀釋藥液足量散布。

水稻紋枯病、瓜果腐爛，使用維利黴素，效果最佳！！

培丹

可溶性粉劑

水稻 / 二化螟蟲
縱捲葉蟲
蔬菜 / 小菜蛾
蚜蟲類
葱蒜薊馬類
柑桔 / 潛葉蛾

熱必斯

可濕性粉劑

葉 稻 熱 病
穗 稻 熱 病
經 濟 好 用
效 果 特 佳

阿斯巴

可濕性粉劑

玉米 / 葉斑病
瓜類 / 炭疽病
大豆 / 銹病
柑桔 / 銹蟬
鳳梨 / 心腐病
蕃茄、馬鈴薯 / 晚疫病
十字花科、蔬菜 / 露菌病
洋蔥 / 紫斑病
小麥 / 銹病
菸草 / 白星病
葱蒜 / 赤銹病



日本武田藥品工業株式會社台灣總經銷

立農化學工業股份有限公司

台北市南京西路22號

電話：5719231~5
5418170