



左：老式香蕉集貨場 右：新式香蕉集貨場（農生）

### 調節種植適期

在正常情形下，香蕉種植時期與收穫時期有密切關係，必須把握適當的種植時間，才不致使產期太早或太遲。為使香蕉主要產期控制在3~5月，高屏地區適當的種植時期，可依下列方法選留吸芽及種植：

(1)新植或更新種植：以吸芽種植的，宜在3月下旬~5月底前種植，但若蕉園排水良好，土壤較肥沃，則宜在4~5月種植。若以塊莖種植，種植時期宜較吸芽種植延緩0.5~1個月。

(2)宿根栽培：應特別注意選留吸芽的位置及時間

，才不致影響香蕉生育，及產期過早或不當。由於宿根栽培蕉株發育較新植（或更新）蕉株快，通常在蕉苗大小及土壤條件相同情形下，若採行宿根的，較更新定植的，產期早1~1.5個月。

因此，高屏地區香蕉若採行宿根，為了主要產期能符合3~5月收穫，選留吸芽的時期及方法，不可依照更新選留吸芽的方法及時期。

目前高屏地區採行更新栽培的，均在「冬至」過後選留吸芽，次年3月下旬~5月種植，如此，可把握大部分香蕉在次年3~5月間收穫。

但若為留宿根，則宜提早1~2個月（即11月前

蚜蟲的專治藥劑•桃蚜的剋星

# 蚜克靈

50%可濕性粉劑

安全！速效！

無臭！無味！

瓜類白粉病的特效藥

# 徽克靈

25%水懸粉

治療兼預防，  
一勞永逸。



總代理：英商卜內門化學工業公司台北分公司

總經銷：嘉泰企業股份有限公司

地 址：台北市新生南路一段120巷3號四樓電：3419251~2