

農業信箱



香菇產量

● 前些日子，在報上看到一則招募香菇栽培戶的廣告，因興趣所使，乃向他們索取簡章參考。簡章上主要述明下列三點：

(1)每訂約戶最低200瓶菌種，每瓶菌種包括20台斤菇木，場地設備、人工管理、水電、殺菌、焙乾等費用300元。而收穫量以兩年算，每瓶可收3台斤，但第2年必須再增加7,000元資金。

(2)入種日期2月15日。

(3)入種至第一次產菇期是90~120天，以後每隔30~50天產菇一次，全由人工控制。

請問：(1)依目前的栽培技術，在此資金下，是否可以不受環境限制，於任何場地均能由人工控制生產？

(2)依現在的栽培技術，可有此種產量？

(3)入種期是否適宜？產期是否如此？(宜蘭縣冬山鄉珍珠村80號游進鴻)

● (1)香菇栽培品種、場地海拔高度及溫差的影響很大。不同品種均有其特性，依目前的技術，尚無法在台灣進行大面積人工控制栽培，也沒有試驗結果顯示此種可能性。該公司所說的情形，應至現場實地參觀瞭解後，才是採信。

(2)品種間產量差異很大，以每瓶菌種2年產量3台斤而言，可說很高，並不常見。

(3)入種期一般在元月~2月間，但出菇時間在4個月內者較少見，而且並非每隔30~50天均可出菇

，因為出菇時期一般每年2~3次，這樣才可維持段木生產較長時間。(廖英明)

鵝跛足

● (1)我放養一百餘隻本地鵝，約有8、9年之久，以飼料加麥片、粗糠、米糠飼。近日來發現一些鵝突然兩腳伸直不會走，情況輕的隔一、兩天就會走動，嚴重的數日內就死亡。請問是何原因？如何防治？

(2)幼鵝以糙米飯加飼料及劍菜飼，發生互啄背毛的現象。是何原因？如何防治？(南投縣鹿谷鄉秀峰村14號林惟粹)

● (1)鵝通常很笨拙，易傷害自己而致跛足。病狀輕者，只在趾部及關節處腫脹或結塊，但退即痊癒。嚴重者不能行動，食慾盡失，幾日內即死亡。此病是由金黄色葡萄球菌 (*Staphylococcus aureus*) 及 Citreus 原虫所引起。

預防方法為儘量減少鵝受驚，抱持鵝時，應抓頸部，飼養場所以柔軟草地或平坦地面為適，避免泥濘潮濕或堅硬水泥地面，以免傷及腿部。如病情嚴重時，可用小刀削除腿部硬塊，再於患部用磺胺劑或抗生素等塗敷治療。

(2)雛鵝本有強烈的啄嚼個性，尤以密集飼養，通風不良或缺乏牧草、菜葉等青飼料時，更易彼此互相啄嚼，以致造成禿背或禿頂，甚或導致嚴重後果。減少飼養密度，充分供應青飼料，或吊掛布條供幼鵝「玩耍」，情況嚴重須修整鵝嘴

，以防止互啄。(曾啓明)

蕎頭休眠

● 我種植的小粒蕎頭，2月間葉尾變黃，慢慢黃到頭部下去。請問此為何病？(雲林縣斗六鎮三光里板橋路6路劉彥)

● 如果根部沒有腐爛現象，便是進入休眠，蕎頭一般都在3月開始休眠，今年氣溫較高，可能會提早休眠。休眠後便可以收穫。(阿月)

番茄夏季栽培

● (1)國曆2月可否播種番茄？(2)如想在農曆6、7月間採收番茄，應在何時播種？

(3)夏季應栽什麼品種？種子何處有售？(台中市東區樂業西街91巷13號管森宏)

● (1)現在如在平地播種番茄，因生育後期恰在高溫期，只有在初期有結果，後期結果較少，所以應採用雙幹整枝，提高早期結果量。

(2)如想在農曆6、7月間採收最好在1,000公尺以上高冷地栽培，農曆2月播種。在平地栽培，宜選耐熱品種。

(3)耐熱品種目前以農友種苗公司的「夏豐」品種較易結果，如在高冷地，可用「農友新四號」。農友種苗公司地址為「高雄市中正二路26號」。(郁宗雄)

