



武田藥品

最低毒，最安全，最廣效  
使用方法最簡便的殺蟲劑

# 培丹 パダン 粒劑

### ■特 性：

- ① 使用培丹粒劑，對水稻一般害蟲，如二化螟蟲、縱捲葉蟲、稻苞蟲、黑尾浮塵子等，效果特佳。
- ② 秧苗使用本劑，可使移植本田50天內不必使用其他殺蟲劑，並可防止黃萎病之發生。

### ■使用方法：

- ① 本劑用於秧田或育苗箱時，在移植前只使用一次。
- ② 撒佈後須用手掃一下，使粒劑落入地面，以便夾帶進入本田。
- ③ 使用後應立即移植插秧。
- ④ 插秧後隨即澆水2~3公分，保持3~5天。
- ⑤ 育苗箱每箱約50~70公克，秧田約兩分地一包。
- ⑥ 若用於本田，每公頃用30kg。

# 維利黴素 バリダシ

液劑

### ■特 性：

- ① 能迅速切斷水稻紋枯病病原菌之生育，使其喪失感染作用。
- ② 本劑一旦接觸病原菌，即迅速發生作用，並波及全部菌絲使其喪失病原性。
- ③ 耐洗性高，故受下雨之影響很小，遇雨倒伏，並可抑制稻穗發芽。
- ④ 絕無藥害，並能提高米質，增加產量。

### ■正確使用方法：

- ① 以噴霧器均勻散布於稻株及葉鞘。
- ② 使用時稀釋500~1000倍。
- ③ 每分地用130~150公升稀釋藥液足量散布。

水稻紋枯病、瓜果腐爛，使用維利黴素，效果最佳！！

## 培丹

可溶性粉劑

水稻 / 二化螟蟲  
縱捲葉蟲  
蔬菜 / 小菜蛾  
蚜蟲類  
葱韭薊馬類  
柑桔 / 潛葉蛾

## 熱必斯

可濕性粉劑

葉 稻 熱 病  
穗 稻 熱 病  
經 濟 好 用  
效 果 特 佳

## 阿斯巴

可濕性粉劑

玉米 / 葉斑病  
瓜類 / 炭疽病  
大豆 / 銹病  
柑桔 / 銹蟬  
鳳梨 / 心腐病  
蕃茄、馬鈴薯 / 晚疫病  
十字花科、蔬菜 / 露菌病  
洋蔥 / 紫斑病  
小麥 / 銹病  
菸草 / 白星病  
葱韭 / 赤銹病



日本武田藥品工業株式會社台灣總經銷

立農化學工業股份有限公司

台北市南京西路22號

電話：5719231~5  
5418170