



左：以長竹竿結附，作為投放標記。
 右上：揚起圍網，將卵羣投到網外側。
 右下：定置網捕撈蓄養的烏賊，移入箱網中。



● 產卵場所


烏賊的繁殖，是以一種樟科植物（*Cinnamomum japonicum* SIEB.）的枝葉捆成1束，附加沉石，並以長竹竿結件於枝葉上，丟入海中，作為枝葉投放位置的標記，這是烏賊最簡單的產卵場。

除此種樟科植物以外，如有其它科屬的植物，枝葉能在海中維持較久的，也可投放作為烏賊的產卵場所。

徵求全省各縣市經銷



HUMA-BLEND



農家的福音!!

撒寶


改良土壤環境及活性
 促進植物吸收肥份
 補充肥料最少養分率
 提高農作物的生產

六大優點：

1. 促進發芽與幼苗生長
2. 增加旱田作物的生產量
3. 防治稻熱病及使土壤活性化
4. 保持較久的土壤濕度
5. 對於作物不會有副作用
6. 施用簡便，用量少，效果大，省本又多利。

台灣總代理：仁寶有限公司

台北市內江街48號 TEL: (02) 311-6960 台北信箱2-299
 台中縣東勢鎮豐勢路546號 TEL: (045) 873861
 TELEX 24051 TRUFWD TAIPEI
 CABLE ADDRESS: "RENBIN" TAIPEI TAIWAN



揚起箱網，搜尋卵羣中的烏賊。

投放枝葉於海底時期為每年4月初旬起，至9月中旬左右為止。烏賊產卵約水深，於4~5月間為7~8公尺，6~9月間為9~10公尺。

● 撈捕作業

撈捕產卵後的烏賊，1天作業1航次。作業方法

蚜蟲的專治藥劑·桃蚜的剋星

蚜克靈

50%可濕性粉劑

安全! 速效!
無臭! 無味!

瓜類白粉病的特效藥

黴克靈

25%水懸粉

治療兼預防，
一勞永逸。



總代理：英商卜內門化學工業公司台北分公司
總經銷：嘉泰企業股份有限公司
發財農藥 地址：台北市新生南路一段120巷3號四樓 電話：3419251-2

揚網後3分鐘，除頭部不變色外，身體轉黑色。



為白天退潮時，於產卵場投下圍網，以長竹竿為中心，距離15~16公尺的四周水域。

等投網完畢後，揚起圍網中心的樟科植物枝葉，則於此種枝葉上可見到許多烏賊卵羣。然後將這些卵羣投到圍網外側。

作為產卵場所用的成束樟科植物枝葉，如有掉葉或葉片枯萎時，最好補填青色枝葉，如為新枝葉，則烏賊產卵率將會提高。

枝葉換新後，即將它結附於烏賊網籠內，烏賊即

快速產卵附着於枝葉上被撈起。取下枝葉上的卵羣，並將剩餘枝葉仍舊投入海中。

用來撈烏賊的圍網，網具的規格，網長600公尺，補網（浪子網至沉子網間）長10公尺，網目大小15公分，在網中央為袋網。用圍網撈獲的烏賊90%以上為產完卵的。

● 膚色變化

所捕獲的烏賊 (*Sepioteuthis Lessoniana* LESSON.)，膚色變化情形，於揚網時為全身米黃色，經過3分鐘後，除頭部不變色外，身體變黑，而經過6分鐘後，全身即呈黑色。經過揚網10分鐘後，全身即變成略微透明的淡青色。

除圍網撈捕外，也可用定置網撈捕烏賊，然後再移入設置在海底為砂地的箱籠內蓄養，直到產卵完畢。於蓄養3天後揚起箱籠，即可見到大量烏賊羣，但於卵羣中常躲着烏賊。

箱籠在水面所圍直徑範圍為20公尺，網深10~15公尺。但需使網能在水中保持離開砂地的是否距離，直到烏賊在箱籠內產完卵後，再揚網。

另外還需注意，有些烏賊卵羣會附着於網上，要小心將這些卵羣取下，再沉放到箱籠外側。

果樹、蔬菜、花卉蘭花成長

開花結實最佳的綜合營養劑



“豐多樂”

- 最科學的、最奇異的綜合植物營養劑
- 只要施用豐多樂，就不必再使用其他肥料了。
- 豐多樂的實際成效：
 - 增加果實的甜度
 - 增加果實的重量
 - 增加果實表皮的光澤
- 最經濟 ● 最特效 ● 最簡便 ● 無臭味 ● 無毒性



PHOSTROGEN

PHOS-TABS

製造工廠： 英國 PHOSTROGEN 公司
 台灣總代理： 奇山實業股份有限公司
 台灣總經理：影泰實業股份有限公司

台北縣橋心園及北村橋東路一段327號
 電話：(048) 322557 - 328857
 台北辦事處：台北市民權西路20號3樓之6
 電話：(02) 5632646, 5115396, 5713515