

揚網後3分鐘，除頭部不變色外，身體轉黑色。



為白天退潮時，於產卵場投下圍網，以長竹竿為中心，距離15~16公尺的四周水域。

等投網完畢後，揚起圍網中心的樟科植物枝葉，則於此種枝葉上可見到許多烏賊卵羣。然後將這些卵羣投到圍網外側。

作為產卵場所用的成束樟科植物枝葉，如有掉葉或葉片枯萎時，最好補填青色枝葉，如為新枝葉，則烏賊產卵率將會提高。

枝葉換新後，即將它結附於烏賊網籠內，烏賊即

快速產卵附着於枝葉上被撈起。取下枝葉上的卵羣，並將剩餘枝葉仍舊投入海中。

用來撈烏賊的圍網，網具的規格，網長600公尺，補網（浪子網至沉子網間）長10公尺，網目大小15公分，在網中央為袋網。用圍網撈獲的烏賊90%以上為產完卵的。

### ● 膚色變化

所撈獲的烏賊 (*Sepioteuthis Lessoniana* LESSON.)，膚色變化情形，於揚網時為全身米黃色，經過3分鐘後，除頭部不變色外，身體變黑，而經過6分鐘後，全身即呈黑色。經過揚網10分鐘後，全身即變成略微透明的淡青色。

除圍網撈捕外，也可用定置網撈捕烏賊，然後再移入設置在海底為砂地的箱籠內蓄養，直到產卵完畢。於蓄養3天後揚起箱籠，即可見到大量烏賊羣，但於卵羣中常躲着烏賊。

箱籠在水面所圍直徑範圍為20公尺，網深10~15公尺。但需使網能在水中保持離開砂地的是否距離，直到烏賊在箱籠內產完卵後，再揚網。

另外還需注意，有些烏賊卵羣會附着於網上，要小心將這些卵羣取下，再沉放到箱籠外側。

## 果樹、蔬菜、花卉蘭花成長

## 開花結實最佳的綜合營養劑

### “豐多樂”




- 最科學的、最奇異的綜合植物營養劑
  - 只要施用豐多樂，就不必再使用其他肥料了。
- 豐多樂的實際成效
- 增加果實的甜度
  - 增加果實的重量
  - 增加果實表皮的光澤

- 最經濟
- 最特效
- 最簡便
- 無臭味
- 無毒性

PHOSTROGEN

PHOS-TABS



製造工廠： 英國 PHOSTROGEN 公司  
 台灣總代理： 奇山實業股份有限公司  
 台灣總經理： 彰泰實業股份有限公司

台北縣橋心園及北村橋東路一段327號  
 電話：(048) 322557 - 328857  
 台北辦事處：台北市民權西路20號3樓-26  
 電話：(02) 5632646, 5115396, 5713515