



及早發現治療

## 新生嬰兒黃疸病 遲醫易成癡呆症



新生嬰兒出現黃疸，務必及早送醫檢驗，以免轉為核黃疸症，導致腦麻痺，使孩子終生癡呆。

一般新生兒在出生後2~3天，皮膚開始呈現黃色，到第4、5天時，黃色會更深，約1~2星期內就會完全消失。這種黃疸如果抽血檢驗，每100CC中胆紅色素值在15毫克以下，則無關緊要，稱為生理性黃疸。如果胆紅色素值超過15毫克以上，就要特別注意了。因為這種高胆紅素症可以使一個活潑健康的嬰兒變成癡呆。

因為新生兒的血液與腦部阻隔網尚未完全形成，如果血液中胆紅素過高，很容易越過阻隔網進入腦部，並沉積於腦部，這就是一般所稱的“核黃疸”。

患有核黃疸的病嬰，多半有食慾減退、嗜睡、微睡及抽搐等症狀，稍長便產生腦麻痺現象，變成癡呆，手脚活動不自如或耳聾重聽。因此對於新生嬰兒出現黃疸現象時必須要做一次抽血檢驗，以便早日發現有無核黃疸。

由於新生嬰兒出現黃疸是一種很普遍的現象，因此常令一般人誤解，尤其是上了年紀的長輩，往往聽信郎中之言讓嬰孩服用什麼黃蓮、山楂子一類的中藥，或在嬰孩臉上、房間貼上什麼紅紙、八卦等迷

信的做法，不但無法獲得療效，反而因此破壞更多的紅血球，同時也影響肝臟功能，值得大家警惕。

為及早發現並治療新生嬰兒黃疸，產婦在醫院生產時，最好住院一星期後才出院，以便及早發現黃疸。同時產婦“做月子”時，不要把新生嬰兒放在昏暗房間內，以防黃疸加深看不出來，等到有一天黃疸厲害，引起核黃疸時，再去求醫就太遲了。（思瑞）



活潑可愛（黃芬）