

整姿。

整枝的原則是：交叉枝或平行枝選留一枝，另枝剪除或予以誘引。左右等長之枝，剪除其一。盆樹高三分之一以下之萌葉幼枝，予以剪除，俾使老枝顯得突出而富情趣。就整株樹形而言，要使前方枝通透，後方枝顯得深遠。培養盆景猶如繪畫，是一種藝術的創作，如何布局以達美的最高境界，要靠各人的慧心獨運。

培養管理防止徒長：盆樹如放任其生長，常致形成徒長，一時疏忽，樹形即逐漸變為紊亂。防止徒長之法，依盆樹性質而不同，一般樹種通用的原則是：摘除新芽、換土移植、剪除舊葉、控制澆水、適度施肥、充分照光，依此原則，兼顧盆樹習性，作綜合運用實施。

黑松之摘芽，是在適當時期自其新芽發生處予以摘除。所謂適當時期，因地區、處所及營養狀態而

有差異，大約在春夏之交，新芽伸長而尚未成針葉之時。樹木是由根吸收水分養分而維持生命，根的生長情形足以左右樹木的消長。

黑松換土移植，在幼木時2年1次。至老木盆景，每4~5年1次。於春3月，或秋季10月後施行。在換土同時，修剪根部，並以適當比例修剪枝葉，以使根吸收的水分和枝葉蒸發的水分維持平衡。換土移植後，鬚根尚未與土壤密切固結，暫置於陰濕通風處所2周，使恢復旺盛生機。

盆景澆水，通常每日1次，夏秋之季溫度高而蒸發特盛時，早晚各1次，遇陰雨潮濕天候，略加節制。初上盆或換土移植後，首次應充分澆水，平時以盆土表面潤濕而無水分滲出盆外為度。

澆水施肥，是盆景養護的兩大要項，盆底排水孔阻塞導致排水不良，澆水過多，常致根部腐爛。烈

日照射強風吹襲而盆土乾燥，也有枯死之虞。施肥寧可盡量稀薄，增加次數，切忌過濃過量。盛夏高溫多濕或連續雨期過久，均不宜施肥

台灣高溫多濕，病虫害的預防，也是盆景管理的重要工作，經常觀察盆樹健康情形，發現症狀，應即噴撒藥劑防治，施行換盆換土時，順便檢查土砂中有無虫卵。



仙人掌

盆花

室內觀葉植物
《增訂再版》

嘉德利亞蘭
專集

台灣可供外銷之
花卉種苗目錄
1979-1980

好消息

慶祝創刊八週年廉價供應

台灣花卉雜誌社出版書籍

1. 仙人掌與多肉植物彩色圖鑑·石玉華·150元
2. 室內觀葉植物~現代生活必須叢書之一
●王銘琪編譯·《增訂再版》·120元
3. 盆花~現代生活必須叢書之二
●王銘琪編譯·《修訂再版》·120元
4. 嘉德利亞蘭專集·吳昭祥、王銘琪合著·80元
5. 台灣可供外銷之花卉種苗目錄(1979-1980)
●由全國專家學者聯合編輯·350元

全套五本原價820元//合購特價500元

郵政劃撥17870號 台灣花卉雜誌社 至六月廿日截止

台北市溫州街14號六樓 3217294·3217234