

熱必斯

ラブサイド

50%可濕性粉劑

徹底防治

效果顯著

稻熱病的救星!!

■正確使用方法：

作物	適用病害	每公頃每次用藥量	稀釋倍數
水稻	葉稻熱病	1 公斤	1200倍
	穗稻熱病	1・2 公斤	1200倍

撒佈方法 / 依所定稀釋倍數加水稀釋，可加展著劑，充分攪拌後，均勻撒佈。

撒佈時期 / 葉稻熱病：認為可能發病時，或葉面開始發生病斑時撒佈之，以後則視狀況撒佈。

穗稻熱病：齊穗期之前撒佈，二次以內。通常在齊穗期之前遇下雨、溫度降低，日照少，陰天多，則極可能發生穗稻熱病，故在雨停時應立即撒佈，預防發病。



武田藥品

維利黴素 バリダシン®

液劑

■特 性：

1. 能迅速切斷水稻紋枯病原菌之生育，使其喪失感染作用。
2. 本劑一旦接觸病原菌時，即迅速發生作用，並波及全部菌絲使其喪失病原性。
3. 耐洗性高，故受下雨之影響很小，遇雨倒伏，並可抑制稻穗發芽。
4. 絕無藥害，並能提高米質，增加產量。

■正確使用方法：

1. 以噴霧器均勻散布於稻株及葉鞘。
2. 使用時稀釋500~1000倍。
3. 每分地用130~150公升稀釋藥液足量散布。

水稻紋枯病、瓜果腐爛，使用維利黴素，效果最佳!!

培丹

50%可溶性粉劑

水稻 / 二化螟 蟲
縱捲葉 蟲
蔬菜 / 小菜蛾
蚜 蟲 類
葱韭薊馬類
柑桔 / 潛 葉 蛾

培丹

4%粒劑

水稻蟲害
綜合防治
使用方法最簡便
低毒安全又廣效

阿斯巴

70%可濕性粉劑

玉米 / 葉斑病 洋蔥 / 紫斑病
瓜類 / 炭疽病 小麥 / 銹 病
大豆 / 銹 病 菸草 / 白星病
柑桔 / 銹 蟬 葱韭 / 赤銹病
鳳梨 / 心腐病
蕃茄、馬鈴薯 / 晚疫病
十字花科、蔬菜 / 黴菌病



日本武田藥品工業株式會社台灣總經銷

立農化學工業股份有限公司

台北市南京西路22號

電話：5719231~5
5418170