

郭 護 / 講述  
王二郎 / 筆記

## 斷乳仔豬 常發生的疾病

由於母豬之胎盤太厚，抗體無法由胎盤傳給仔豬，仔豬由初乳獲得抗體，但經一段時間即自然消失。在斷乳時，抗體已降得很低甚至消失，所以仔豬於斷乳後，最容易發生疾病。

初乳內之抗體，它消失的時間約在出生後42天，此時注射疫苗最好。如果太早注射，被移行抗體中和，就不發生效果。豬瘟疫苗第一次注射在生後42天，第二次加強注射在生後70—80天，如太遲注射時，則移行抗體已消失，此期間感染就發病，或在注射後，易產生接種反應。以下是仔豬斷乳後常發生的疾病。

### 豬傳染性胃炎 (TGE)

病原是病毒，於哺乳時就會發生。在發生時，仔

豬整窩下痢、脫水，死亡率高。此病毒主要是感染腸管粘膜上的皮細胞，細胞被破壞，絨毛就萎縮，腸管變薄，營養無法吸收而聚集，造成高滲透壓。

水份滲入腸腔，腸就積水，腸蠕動也增快，因而發生下痢、脫水兩種症狀。解剖腸管變成透明，絨毛萎縮。發生於斷乳前後之仔豬，感染率及死亡率很高，三月齡以上即有抗力。

傳染性腸胃炎在治療上還沒藥劑可防治，最近日本可能有TGE疫苗問世了。如發生TGE，可用患TGE病豬之腸管粘膜內容物磨碎，在孕豬產前2—3周就口服接種，母豬吃後不會發生流產情形。此豬如接種一強毒，於分娩時產生極高之抗體力價，仔豬吃初乳而獲得極高之抗體，足以抗抵TGE病毒攻擊。

### 農業(園藝)用遮光網

降低溫度、減少光線的最佳利器！  
調整栽培環境的妙方！

# 台和網

## DIONET ダイオネット

適合：苗床、香菇、蘭花、室內植物  
及各種作物栽培場所之光線和  
溫度控制。屋外蔭棚之應用等  
用途廣泛、經濟實用。

尺 寸：寬度1公尺、1.8公尺、2公尺。長度均為50公尺。  
遮光率：自50%~95%多種。  
顏 色：黑色、綠色、銀色。  
來 源：台製、日製均可供應。

◀敬請指教·歡迎洽購▶

台和園藝企業股份有限公司

台北市士林區中正路104巷1弄2號

TEL: (02) 831-3302 郵政劃撥 101360

### 農業繁殖栽培業者的好消息!!

◀維他命的新應用▶

——新植物活性劑——

# 速大多<sup>®</sup>

## START スタート

對任何植物苗的移植、插芽、  
插枝、高壓條……  
具有迅速催芽、開根、增加活  
力的奧妙神速奇效!!

使用1,000倍液·用量省 效果大

\*精美彩色說明書備索\*

日 本 TAG PRODUCTS INC. 製造  
總代理 台和園藝企業股份有限公司  
台北市士林區中正路104巷1弄2號  
TEL: (02) 831-3302 郵政劃撥: 101360