

農業信箱

泥鰌外銷

(1)泥鰌繁殖池應如何設計？

(2)每坪可放養幾尾？

(3)池內的土應保持多厚？土面水位高度若干？

(4)以何種飼料飼養較宜？

(5)放養後多久可收成？售往何處？（宜蘭縣五結鄉二結村89號陳樹木）

(1)泥鰌自然繁殖池面積，最好在10~30坪間。太小不會生殖，太大不好管理。水深約1.5台尺，水中應有水草、樹葉或棕梠片，做為卵附着之用。如人工繁殖，不需繁殖池。

(2)通常每坪放養300~500尾，視養殖池的條件而定。

(3)池內土的厚度15~30公分，水位高1~1.5台尺。

(4)泥鰌的飼料，應以動物性飼與植物性飼配合較佳。

(5)放養3公分大的泥鰌，約5個月可收成出售。目前收購外銷的人很多，可與竹北水試分所聯絡。

（胡興華）

氯化精施用法

(1)氯化精灌注土壤，每孔注入3~5毫升，是否指原液的數量？注入時的土壤性狀是剛耕碎後的乾鬆土效果佳，或者是用平整後平硬的土處理較好？

(2)氯化鈣和硼砂是否能同時混合肥施用？（高雄縣路竹鄉大社路349號蘇文富）

(1)氯化精又稱氯化苦，英文名稱 chloropicrin。使用

時，每孔注入3~5毫升，是指原液而言。氯化精極易揮發，進入土壤後可揮發成有毒的氣體，在土壤中四處滲透，達殺菌效果。為使本劑能在土內便於滲透移行，土壤應以乾鬆性狀者為佳。又為避免藥劑於尚未達殺菌效果前即已跑出土外，實行覆蓋，或土壤耕鬆後，將表土緊壓，均可延長藥效。

(2)氯化鈣與硼砂最好不要同時施用，這是藥劑使用的原則。在勞力許可的情況下，不管理論上可否混合，均以不混合使用為宜，以免影響預期的效果。（張清安）

迷你椰子

(1)我種的一棵迷你椰子樹（多上椰子）約1公尺高，年開花結果子很多。但歷年想種種辦法播種持不出芽爛掉。請問是何原因？

(2)我種的紅色、黃色九重葛不開花。請問如何管理才會開花？（宜蘭市民橋新路87巷10號陳秋和）

(1)迷你椰子樹在本省易開花，但可能是遺傳性或溫度不足，均無法結果子，所看到的黃色小粒是無子的果實，當然不會發芽。

(2)九重葛一般在新梢頂端開花的品種較多，所以過份修剪，就無法開花，應栽植在庭園，讓自然生長，才會開花。（黃敏展）

鵝品種

(1)雌鵝在幾週齡注射霍亂預防針最適宜，須要注射多少CC？

(2)美國愛姆登鵝、丹麥白羅曼鵝及荷蘭齊富樂鵝，以何種較優？每種年產蛋量約多少？

(3)據說離鵝用反肛門法辨別雌雄，日後會長不大。此種說法是否正確？

(4)種鵝早上吃沾露水的草，是否會感染腸炎而放水樣便或白便？

(5)本地鵝及外來鵝，以養何種較有前途？（嘉義市興業路43巷39號孔令鑫）

(1)離鵝約於4週齡注射霍亂預防血清為佳，劑量為1~2CC，以後每隔半年注射1次，每次2~5CC。

(2)愛姆登鵝年產蛋40~50枚，成年體重為7~8公斤。白羅曼鵝為50~60枚，成年體重為6~7公斤。齊富樂鵝年產蛋為70枚，成年體重為5.5~7公斤。飼養何種品系較優，須視個人喜好，經營方針及市場需要而定。

(3)利用肛門鑑別雌雄，如使用方法正確，應不會影響日後生長。

(4)沾有露水的草，易為寄生虫所聚集，鵝如食用，易感染胃腸方面的疾病，引起白色水樣便。太陽出來後1小時再行放牧，就可避免此弊。

(5)獅頭鵝（本地種）生長速率，飼料效率均和白羅曼鵝（外來種）相似，但每台斤價格較後者多十元。白羅曼離鵝價格較低，市場受歡迎程度略遜。（曾啓明）

