

造成，也可能由於遺傳上的性能力欠佳，或公鴨羣飼時互鬥所造成的。它的症狀是公鴨的陰莖垂掛於洩殖腔外而不再上舉，發生後，陰莖極易沾泥並感染細菌，導致腐壞。

治療時，應將病鴨隔離於安靜的鴨舍，並給予清潔墊草和飲水，每日於陰莖處塗以抗菌軟膏，直至陰莖縮回為止。此種公鴨極少有治療價值，應予淘汰。

(3) 槳翅或飛機翼：在中鴨開始長主翼羽時，偶而會發現一些鴨子的一邊或兩邊翅膀下垂而無力上舉，有時也可發現主翼羽突出於身體兩側，形似飛機的雙翼。

造成這種現象的原因，有些人認為是供應過量的蛋白質飼料，造成羽根充血，羽毛的生長比支持羽毛的肌肉發育還快，故造成肌肉無法支撐羽毛而形成槳翅。

有些學者則認為是遺傳能力欠佳而無法支撐兩翅。事實顯示，在

同一種飼料餵飼下，整羣鴨中僅有幾隻會發生這種現象，故此種缺陷是因遺傳上肌肉能力欠佳所造成。因為這種鴨子缺乏商用價值，故不宜留種，應予淘汰。

(4) 軟脚症：此病仍因飼料中缺乏維生素D或菸酸 (Niacin)。症狀是腳變形扭彎，腳踝關節突出。在飼料調配時，每公噸飼料應添加菸酸30~40公克。

(5) 啄羽：由於飼養密度太高，飼料中蛋白質含量不足或缺乏綠餌，鴨有互相啄羽毛的壞習慣。發生啄毛的鴨羣中，翻開兩翅，可以發現背部羽毛全部脫落，嚴重時，會互啄至死。鴨子互相啄毛，不但鴨羣生長遲鈍，且保溫及防濕能力均不良，導致死亡率增加，因此應於日常飼料中，供給適量的蛋白質，並將飼養空間加大。

(6) 蛋滯留及落蛋：產蛋鴨常有蛋產不下來，而滯留於生殖道中的

現象。

一般可將病鴨隔離於暗室中，再以橄欖油或礦油伸入生殖道中塗抹。如蛋仍久置不下時，則於腹部以適當的力量將蛋擠出，但用力不宜過猛，否則將蛋擠破，容易造成內部發炎。

此外，有些鴨生殖道結構不良，輸卵管的喇叭口無法有效的接住卵巢排出的卵時，即形成落蛋現象。若母鴨腹部腫脹，以手觸摸可發現腹內有蛋形物時，可能即為此症，此種鴨應立即淘汰。

(7) 子宮脫垂：產蛋鴨經常會有



濃縮液體有機肥料

日本原裝進口

農林廳肥料登記農肥字第0149號  
已列內銷檢驗第302014號



# 特奇液 タキイ

保證功效：

※促進發芽 ※提高品質 ※防止蟲害  
※提早收成 ※增加收量 ※改善土質

獨特成分：

含氮、磷、鉀外，另有核酸、亞米諾酸、  
加里高級成分、完全有機質成分。

日本タキイ(TAKI)種苗株式會社 榮譽出品

總經銷：日九實業股份有限公司

台北市敦化南路390巷46號 金城大廈3樓之一

電話：7810131~2



說明書備索

徵求台東經銷商



# 豐產富 (プラントフッド)

農林廳肥料登記農肥字第0149號 已列內銷檢驗第302014號

- 特性：高成份、速効性，用粉、泡水兩用均可栽植。
- 適合作物：果樹、蔬菜、果菜、水稻、雜作、育苗等等作物均可。
- 詳細說明書：備索(來函請寄日九實業股份有限公司)
- 經銷商：誠徵各地區特約商
- 製造廠：日本關西日產化學株式會社 榮譽出品