

子宮脫垂現象，導致子宮脫垂可能由於高產鴨生殖道鬆弛，或蛋大而鴨需用力大始可下蛋，均會使子宮脫垂。又人工授精時，由於工作者的疏忽，於授精完畢後，未將生殖道回復原位，也會造成此種現象。

子宮脫垂後，常因鴨羣互相踐踏或拖抹地板而導致潰爛。發現病鴨時，應立即以溫水泡好的收斂劑，將生殖道翻出清洗，然後塞回原位，並將病鴨隔離，以低蛋白質的

輕鬆性飼料餵飼，使易於消化。

為避免病鴨立即再產蛋，可於飼料中添加氧化鋅25000ppm。

(8)生殖道發炎：即所謂的粗壳蛋症，因生殖道發炎後，蛋壳部分無法行正常的分泌作用，故於蛋壳表面呈現粗糙的結構，嚴重者甚至無法形成完整的蛋壳。

一般初產不久的母鴨，不宜行人工授精。因為初產母鴨之生殖道組織仍很堅韌，不易將生殖道自泄殖腔翻出，若用力強迫翻出，常易導致生殖道受傷，因而發炎，故最好於初產後1~2個月，才開始行人工授精。

公鴨在採精時，精液應儘量避免污染糞便，同時最好將採得之精液做適當的稀釋（約稀釋3倍）。人工授精使用的工具，應做徹底的消毒，注精管如污染糞便時，最好能以70%酒精棉消毒。


母鴨在翻出生殖道時，應儘量

避免污染泄殖腔附近之糞便，同時操作人員亦應避免以手觸及生殖道之粘膜部分。生殖道翻出時間不宜過久，注精完成後確實將生殖道回復原位。

若發現母鴨生殖道充血時，可能即已發炎，可使用每升含鏈黴素100公克，配盤尼西林10萬單位混合之水溶液注入生殖道，每天一次，每次1cc。母鴨停止人工授精，數天後即可恢復。

(9)黃麴毒素病：此病於1960年首先發生於巴西農場中的家畜，包括鴨和火雞。主要的黃麴菌存在於飼料中，此種病菌分泌一種毒素，慢性為害對此種毒素敏感的動物。鴨對黃麴毒素特別敏感，尤其小鴨，其耐受性很低，極易死亡，且阻礙鴨的生長及減低產蛋率。所以養鴨時，絕不可使用發霉的飼料，且飼料應向信用可靠的廠商洽購。

(下期待續)



日本三共株式會社榮譽出品

立枯病特效藥!!

全國唯一蒙農林廳正式推廣之水稻苗立枯病防治藥劑

立枯靈 30%液劑

(殺紋寧・日名：タチガレン)

殺菌!! 促進根的發育!! 提高生理活性!! 抗寒害!!

一種農藥多種效果!!

登記證：經市進字第478號

立枯靈的特長

- ▲確實防止立枯病及立枯性腐敗症之發生。
- ▲增強根部活力，促進根部生長及防止老化，確保培育出健康苗。
- ▲促使移植後提早成活並使生長力旺盛。
- ▲使用時既安全簡便，可與他種農藥混合使用。

國外資料

(僅供參考)

立枯靈在國外尚用於防治林木苗木立枯病、瓜類苗立枯病、甜菜生薑立枯病、蔬菜苗立枯病、康乃馨立枯病、甜椒立枯病、菸草猝倒病、蕃茄苗立枯病、萎凋病、草莓苗立枯病、大豆、紅豆、菜豆等豆科作物白絹病

台灣總代理 中國化學製藥股份有限公司 台北市襄陽路23號 電話：3816740~9

總經銷 寶昌貿易股份有限公司 台北市敦化南路514號之3三樓 電話：7052414