


蘆筍播種



同時也沒有如此勉強提早發芽的必要。因此我認為所謂“種子的處理”，在實際情形下，似無何意義。種子的篩選時，除去直徑 3 公厘以下的小粒種子，只播 3 公厘以上的種子，可獲得發育良好苗，對產量亦有良好的影響（據 Huyskes 氏 1960 報告）。這方法易於實施，不妨試之。

育苗所需的種子量，對苗圃面積及筍田面積比率見表，只限於條播法。

苗圃的面積與所需種子量

苗圃面積 (坪)	種 子 量		種子粒數	筍田面積 (公畝)
	容 量 (c.c.)	重 量 (克)		
20	46.8	35.6	1,800	10
40	93.6	71.2	3,600	20
60	140.4	106.8	5,400	30
80	187.2	142.4	7,200	40
100	234.0	178.0	9,000	50
300	702.0	534.4	27,000	1.5
3,000	7,020.0	6,344.0	270,000	15

（摘自洪立教授編譯「蘆筍栽培技術」

78~82頁，1976年）



蘆筍採收

冬瓜不著果

冬瓜開花不著果可能是授粉不良或偏施氮肥所引起的。此外，瓜蔓過於茂盛透光不良，使植株體內的碳水化合物與氮的比率失去平衡，即氮含量過多也會導致不著果。

冬瓜每株留果數，應視植株發育情形而定，一般每蔓留 1~2 果，其餘發育不良者應早期摘除，所以每株以不超過 3~5 果為宜。但如先將部分嫩果早期採收出售，則另當別論。