



武田藥品

最低毒，最安全，最廣效
使用方法最簡便的殺蟲劑

培丹 パン 粒劑

殺蟲效果最好，兼有阻止病原菌生育的作用，故可減少稻熱病、紋枯病等的發生。

■特性：

- 1 使用培丹粒劑，對水稻一般的害蟲，如二化螟蟲、縱捲葉蟲、稻飛蟲、半厚皮蟎子等，效果特佳。
- 2 秧苗使用本劑，可使移植本田150天內不必使用其他殺蟲劑，並可防止黃萎病之發生。

■使用方法：

- 1 本劑用於本田或育苗期時，在移植前只使用一次。
- 2 撒佈後用用手搖一下，使粒劑落入地面，以便火帶進入本田。
- 3 使用後應立即移植秧苗。
- 4 插秧後隨即灌水2~3公分，保持3~5天。
- 5 育秧箱每箱約50~70公克，本田約兩分地一包(3公斤)。
- 6 若用於本田，每分地用一包(3公斤)。

維利黴素 バリダシン

液劑

最近有關機構經常提到有機砷劑農藥，對水稻易產生藥害，對人畜易產生毒害，本公司鄭重推薦“維利黴素”它是一種抗生物質，對人畜安全，對水稻絕無藥害。

■特性：

- 1 能迅速切斷水稻紋枯病病原菌之生育，使其喪失感染作用。
- 2 本劑一旦接觸病原菌，即迅速發生作用，並波及全部菌絲使其喪失病原性。
- 3 耐洗滌高，故下雨之影響極小，遇雨倒伏，不會刺激病變發生。
- 4 絕無藥害，並能增高米質，增加產量。
- 5 可與培丹及其他大部份殺蟲劑等混合使用。

■正確使用方法：

- 1 以噴霧器均勻散佈於秧株及葉節。
- 2 使用時稀釋500~1000倍。
- 3 每分地用130~150公升稀釋液足量散佈。

水稻紋枯病、瓜果腐爛，使用維利黴素，效果最佳！！

培丹

可溶性粉劑

水稻 / 二化螟蟲
縱捲葉蟲
蔬菜 / 小菜蛾
小蚜蟲類
葱蒜馬鈴
柑桔 / 潛葉蛾

熱必斯

可濕性粉劑

葉 稻 熱 病
穗 稻 熱 病
經 濟 好 用
效 果 特 佳

阿斯巴

可濕性粉劑

玉米 / 葉斑病
瓜類 / 炭疽病
大豆 / 銹病
柑桔 / 銹病
鳳梨 / 心腐病
蕃茄 / 馬鈴薯 / 晚疫病
十字花科、蔬菜 / 露菌病



日本武田藥品工業株式會社台灣總經銷

立農化學工業股份有限公司

台北市伊通街27號二樓

電話：5719231~5
5418170