

尚須仰仗風。但風勢強烈，會嚴重危及椰樹的發育。沿海一帶的潮風，常使椰葉乾枯，椰實產量大減。

對土壤的適應力強，通常喜歡土層深厚(80~100公分)、通氣良好、排水性優的肥沃沖積土、壤土或砂質壤土，pH值在5.2~8.0之間，但超過7.5時，土中養份易失平衡，常缺少鐵、錳。

在雨型分佈不均的地方，地下水除可補足早期土中的缺水外，水位適高時尚能供應椰樹生長所需的礦物質及微量元素。

綜合言之，可可椰子的生長環境須要高溫、恒濕、日光足、沒有強風、適當的土質與地下水，根據這些條件並証諸本省各地實際的結實量，歸納出本省最適宜的推廣區域應在台南以南、海拔300公尺以下地區(恒春半島除外)，如在坡地，須有充份的水源。西部濁水溪以北，東部花蓮以北，及各地沿海鹽鹼土及季風強勁的地區均不可推廣。現在各地主要栽植於公路兩側甚為不妥，一則妨碍未來道路拓寬，再則中後期嚴重落果，行人安全堪慮；若供為海邊防風林，也不適合，因季節風過大，嚴重影響產量且防風效果不大。所以如何加強邊際土地的利用，乃當前急務。最好能在現有廣大的鳳梨及香蕉園進行間植。

品種的選擇

可可椰子的遺傳型態複雜，品種劃分很困難。

我們曾將本省品種，依果實開始着生的早晚分為早生種及高幹種兩大類，又將高幹種依果色及花序顏色等區分為多雌花種、橘紅色種、橘黃色種、黃白色種、深褐色種、淺褐色種、綠色種、淺綠色種及綠褐種等十種。先後進行了品種間的結實量，抗病虫力及椰乾、椰油含量等的調查比較。

結果顯示：品種間產量差異不大，以早生種及高幹種中的綠色種及淺綠色種產量較高；各品種對主要虫害的抗性則具顯著的差異，以綠色種的抗性最小，褐色種的抗性最大；主要品種的椰乾量依大小次序為褐色種、橘黃色種、綠色種、橘紅色種、早生種、黃白色種；若以油脂工業生產為目標時以選擇高幹種之褐色種為最優，橘黃色種及綠色種次之，然在同一品種內則以選擇大型果最為有利；若僅以喝椰水為目的時，則不妨選擇早生的矮幹種及橘紅色種，因這兩品種內殼容積大、含汁多，尤其是早生種收益期早，第四年即可開始結實(高幹種為7~8年)，但早生種40年的衰退期要比高幹種的60~80年短得多。


大克菌靈[®] (大克爛) 50%可濕性粉劑

農藥許可證：經市進字第1151號




作物種類	病害種類	防治時期	使用倍數	施用法
草 菇	菇床白絹病 及雜菌	菌種成活後 未發菇前	3000	每坪用稀釋液1公升，雜菌嚴重時採用2000倍，但不可用1000倍
高 筍	菌核病	種後 20~30天 發病初期	2000	每7~10天一次 連續3~4次

大克菌靈防治白絹病效果



大克菌靈對草菇增產效果



(資料來源：台灣省農業試驗所66年委託試驗報告)

製造工廠：

英國 The Boots Company Ltd.

總代理：

嘉寶有限公司

台北市郵政信箱3339號