

適當芒果栽培法

俊彥

徹底實施間伐：目前新品種芒果每公頃栽培株數超過 600 株，且樹齡都在 6 年生以上，密植所投資的種苗、農藥、肥料以及工資等較疏植者多。而且樹與樹間交接重疊，樹勢發育衰弱，樹型不整，容易導致結果不良實；實在是一種不經濟的作法。

因此，本省芒果最適當的行株距為 10 公尺×10 公尺，即每公頃種植 100 株，但最高不超過 200 株為原則。如果是 6 年生以上的成樹，應儘快砍伐，每公頃保留 200 株為原則。實施間伐，不僅在作業管理方便，本年（間伐後第一年）芒果產量亦未減少，是一舉兩得的作法。

注意整枝修剪：發現過密枝，枯枝、細弱枝以及病虫害枝等應隨時剪除。同時在果實採收後，原結果枝條也應種短，以培養碩壯的結果母枝，擴大結果面積。

改善肥培管理：目前栽培芒果的土壤非常不理想，最近農民雖稍有施肥，但大部分只限於使用複合肥料，因複合肥料三要素配方固定，容易發生某種要

素量偏高或不足現象，必須另施單質肥料予以補足，尤其 6 年以上的果樹，鉀肥需要量必須增多。

根據專家指示：PH 值高的土壤應施用硫黃粉。缺乏硼、鋅的果園應在葉面噴洒硼酸及硫酸鋅。缺磷的土壤應噴洒或灌注磷酸。並且應以堆肥混合過磷酸石灰來作深層施肥或噴洒微量元素等，依據科學的資料改善肥培管理。據悉，經施用硫黃粉降低土壤 PH 值並噴洒微量元素的果園，本年所結芒果果粒較大且富光澤。

推行草生栽培與果園覆蓋：芒果園應種植百喜草 (Buhia Grass) 等覆蓋作物。如一時無足夠的百喜草草種，也可讓果園自生雜草，然後於每年冬季乾旱季節，將覆蓋作物割下，覆蓋在樹幹周圍，並與樹幹保持相當距離，以防病虫害潛伏。並避免清耕，增加土壤有機質，保持土壤水分及地力，避免土壤被冲刷。

徹底防治病虫害：防治病虫害可依下列三點實行：(1)在芒果盛花期，除非發現虫害，儘量不用殺虫劑。(2)依照植物保護手冊（農林廳編印）的規定，使用農藥。(3)在冬季或果實採收後，亦應按時噴藥，以根絕病虫害的感染。

果樹、蔬菜、花卉蘭花成長


開花結實最佳的綜合營養劑

“豐多樂”

- 最科學的、最奇異的綜合植物營養劑
- 只要施用豐多樂，就不必再使用其他肥料了。

豐多樂的實際成效 ● 增加果實的甜度 ● 增加果實的重量
● 增加果實表皮的光澤

- 最經濟 ● 最特效 ● 最簡便 ● 無臭味 ● 無毒性



PHOSTROGEN

PHOS-TABS

製造工廠：

台灣總代理：

台灣總經理：



英國 PHOSTROGEN 公司

奇山實業股份有限公司

彰泰實業股份有限公司

彰化縣埔心鄉瓦北村瑞慶路一段 327 號
電話：(048) 322557、328857
台北辦事處：台北市天祥路 47 巷 14 號一樓
電話：(02) 5632646、5115396、5713515