

。每10公畝拉草乳劑用量為180CC加水100~120公升。最好避免噴到苗株上。每10公畝的基肥用量約如下：

、腐熟堆肥1200~1500公斤或鷄糞400~500公斤、硫酸銨25~30公斤、過磷酸鈣40~45公斤、氯化鉀8~12公斤。

以現有經濟栽培品種的株型而言，畦寬1.2~1.3公尺（包括畦溝）經開溝整畦後，實際畦面寬度約80公分，畦溝占40公分，以每畦栽植兩行，兩行間的距離約50公分。栽植處較靠近畦溝邊，便於實施畦溝灌溉。

本葉展開四~五片時為定植適齡，如及時定植，則定植所受的傷害少，成活率也高。但一般農家慣於採用超過適齡的苗株，幾乎到本葉6~7片時才定植，而且採苗方法非常粗放，斷根甚多，定植傷害甚大。所以定植後苗株雖成活，但因為苗株損傷，苗株基部原有的2~3片本葉枯萎，生育停頓數天，無形中增加管理費用，拖延生育日數。

適齡時定植，配合定植前的苗株硬化處理，同時於掘苗前三小時充分灌水，使苗株充分吸收水分減少採苗後之萎凋速度，並可減少採苗時發生斷根現象，栽植深度適宜，則苗株成活迅速、植株生長轉為旺盛

、莖葉發育必壯。

一般農家偏愛施用氮肥，會促進徒長。如植株徒長，主莖不大、頂花球也不大、產量不會高。以現有栽培品種而言，株距以45~48公分，每10公畝栽植株數以2800~3000株，較為適當。

施肥、灌水

為生產較大的頂花球，必須於未出蕾前使植株具有本葉二〇片的健壯株勢。所以施肥要訣是，如何在定植後僅僅四十天內能促使植株長出二十片本葉。為符合這種需求須注重基肥施用，並在生育初期，每隔8~10天追肥一次，共約四次，以利生長。

每10公畝地的追肥用量約如下：

硫酸銨80~100公斤或尿素40~50公斤（分四次施用）、過磷酸鈣25~30公斤（用於第一次，如天氣寒冷時再施一次於畦溝底邊）、氯化鉀15~20公斤（分用於第三~第四次）。

一般農家甚少施用氯化鉀，致葉部軟弱、霜病發生多、主莖不大、花球較小。至於施肥方法均慣於畦面點施，肥料曝露、肥分揮發損失大、肥效不高。今後應採用穴施或條施，施用後覆土，以免肥分損失及肥傷的發生。



夏秋甘藍

- 早生豐產，結球緊實，扁球型，球重2公斤左右，品質特優，貯運力強，適於內外銷。
- 耐熱性強，在平地適於初秋、秋、冬、春栽培，如能配合栽培技術，也能在夏季栽培，是唯一四季隨時都適於播種栽培的優良品種。

栽培說明書、價目表備索



■■農友種苗公司育成的各種瓜類及蔬菜種子，信用可靠、品種純良，為您帶來豐收。

農友種苗股份有限公司

地址：高雄市中正二路26號

電話：(07)2919106~9(四線) 郵政劃撥：41866