



武田藥品

維利黴素 バリダシン®

液劑

最近有關機構經常提到有機砷劑農藥，對水稻易產生藥害，對人畜易產生毒害，本公司鄭重推薦“維利黴素”，它是一種抗生物質，對人畜安全，對水稻絕無藥害。

■特性：

- (1) 能迅速切斷水稻紋枯病病原菌之生育，使其喪失感染作用。
- (2) 本劑一旦接觸病原菌絲，即迅速發生作用，並波及全部菌絲使其喪失病原性。
- (3) 耐洗性高，故受下雨之影響很小，遇雨倒伏，不會刺激稻穗發芽。
- (4) 絕無藥害，並能提高米質，增加產量。
- (5) 可與培丹及其他大部份殺蟲劑等混合使用。

■正確使用方法：

- (1) 以噴霧器均勻散布於稻株及葉鞘。
- (2) 使用時稀釋500~1000倍。
- (3) 每分地用130~150公升稀釋藥液足量散布。

水稻紋枯病、瓜果腐爛，使用維利黴素，效果最佳！！

熱必斯 ラブサイド 50%可濕性粉劑

■正確使用方法：

作物	適用病害	每公頃每次用藥量	稀釋倍數
水稻	葉稻熱病	1 公斤	1200 倍
	穗稻熱病	1・2 公斤	1200 倍

撒佈方法 / 依所定稀釋倍數加水稀釋，可加展著劑，充分攪拌後，均勻撒佈。

撒佈時期 / 葉稻熱病：認為可能發病時，或葉面開始發生病斑時撒佈之，以後則視狀況撒佈。

穗稻熱病：齊穗期之前撒佈，二次以內。通常在齊穗期之前遇下雨，溫度降低，日照少，陰天多，則極可能發生穗稻熱病，故在雨停時應立即撒佈，預防發病。

徹底防治

效果顯著

稻熱病的救星！！

培丹

可溶性粉劑

水稻 / 二化螟 蟲
縱捲葉 蟲
蔬菜 / 小菜蛾 類
蚜 蟲 類
葱韭薊馬類
柑桔 / 潛 葉 蛾

培丹

4%粒劑

水稻蟲害
綜合防治
使用方法最簡便
低毒安全又廣效

阿斯巴

可濕性粉劑

玉米 / 葉斑病 洋蔥 / 紫斑病
瓜類 / 炭疽病 小麥 / 銹 病
大豆 / 銹 病 菸草 / 白星病
柑桔 / 銹 病 葱韭 / 赤銹病
鳳梨 / 心腐病
蕃茄、馬鈴薯 / 晚疫病
十字花科、蔬菜 / 霜霉病



日本武田藥品工業株式會社台灣總經銷

立農化學工業股份有限公司

台北市伊通街27號二樓

電話：5719231~5

5418170