

及樹齡不同而異，一般而言，葉與果以4~6:1較適當。

獼猴桃枝條像藤樹一樣具有纏繞的特性，枝條管理好壞，對樹本身發育影響很大。主枝形成階段，纏繞棚架鐵絲上的主枝，於硬化前如不適時加以鬆開，將隨着枝條肥大與鐵絲連結在一起，而發生生理障礙。一般在6月下旬至7月下旬是鬆開纏繞在鐵絲上枝條的適當時期。摘心很重要，對生長旺盛的枝條實行摘心，抑制繼續生長，有促進果實肥大效果。於結實部位先端第8節左右的位置摘心，如摘心後發生副梢，則副梢留1、2節再摘心，使樹勢發育平穩。

惱人的病虫害

病虫害以蚜蟲、捲葉蟲、介殼蟲及根瘤線蟲等發生較普遍，分述如下：

蚜蟲：是一種致命的害虫。從樹幹基部穿入，環食為害，被害植株多枯死。普通每二年發生一次，發生在6至9月，尤以6月中旬至7月下旬為害最烈。防治方法：平時經常保持植株基部的清潔，注意刈除雜草，果園除草時不要緊靠植株基部。在6月中旬噴施低毒性有機磷劑，如發現枝幹穿孔，則將藥液灌入孔中。

捲葉蟲類：是傷害果實的害虫。每年5月下旬至10月上旬發生。發生期間，噴施低毒性有機磷殺蟲劑或50%撲滅松乳劑1,000倍。

介殼蟲類：果園到處都會發生。被害植株樹勢虛弱，並誘發煤病污染果實，而失去商品價值。每年的5月中旬、7月中下旬及9月上旬發生。發生期噴施50%撲滅松乳劑1,000倍。

根瘤線蟲：寄生在根部，每年發生2次。於5月下旬至6月上旬正值根的最大伸長期，每平方公尺灌注6公升的DCHP乳劑500倍。如果是粉劑，則每平方公尺使用30~45公克並與土壤充分混合。



獼猴桃

系統性殺菌劑

霉敵[®]-340

可濕性粉劑

- 系統性殺菌最完全！
- 最速效！
- 最安全！

® 註冊商標

廣效性燻烟殺菌劑

霉敵[®]

燻烟片劑

- 最新型燻烟殺菌劑！
- 殺菌最徹底！
- 無臭、無味、最安全！
- 省時、省工、最方便！



美國默沙東(默克)藥廠 榮譽出品
MERCK SHARP & DOHME INTERNATIONAL

台灣總代理：

美商美國新美公司 U. S. Summit Corp.

台北市八德路三段20號 (台資大樓八樓) TEL: 7719163 ~ 5