



非洲菊 (林吉郎)

非洲菊

■曾秀瓊

耐熱性强

非洲菊學名 *Gerbera Jamesonii*, Bolus. 英名 Transvaal Daisy; Barberton Daisy. 別名：扶朗花、嘉寶菊、火輪菊，為菊科植物。

非洲菊原產於南非洲，對高溫抵抗力強，是一種熱帶花卉植物。在夏季火傘高張的氣候下，很多花卉植物生長都不太良好，只有非洲菊仍然面不改色，傲視羣花，爭奇奪艷地滿園開放。因為種植方法簡單，生長容易，所以到處可見。

非洲菊第一次由國外引進，是在1928年。由於本省氣溫暖和，氣候條件與原產地的氣候相差不多，因此引進來的非洲菊在很短的時間內，很快地就能適應，並且生長得好，目前已經普遍栽培於本省各地。

此花之學名，是為了紀念發現這種植物的 Jameson 這個人而命名。至於其中名，乃是因為它原產在南非洲，所開出來的花型類似雛菊 (Daisy)，集此兩大特性，故名非洲菊。

非洲菊是一種周年開花之宿根性草本花卉，花期很長，連續不斷地開。非洲菊的植株很矮，只有30~45公分高，葉片由根基直接長出，叫做根出葉，狀似蒲公英。葉散開平展而生，有些似菠菜。葉面起伏不平，呈羽狀裂葉，成熟葉全株有毛，葉面約12~25公分長，有時可大到65公分。葉的基部狹小，中央部寬，邊緣鋸齒狀。葉色呈濃綠色。種植數年後，葉片可長到數十枚之多，形成一株很大的非洲菊。

花瓣呈輻射狀圓形排列，狀似太陽之光芒，故又名「太陽花」。有單瓣、重瓣與半重瓣3種。重瓣種之花瓣整齊緊密重疊在一起，與雛菊的花瓣排列相同，所以被稱為「雛菊型花」。每株可抽花莖數支，一莖一花，花色有白、粉紅、黃、橙、深紅、紫色等多

種，亦有紅瓣黃心之變化者。花徑各有大小，大者可達13公分左右。花梗長而直立，很適合插花材料用。

種植非洲菊對環境的要求不甚嚴格，選擇陽光充足，排水良好的砂質壤土最佳。一般採用分株繁殖法，於春季或秋季施行。把體積大，生長旺盛的非洲菊連同地下根部全部掘起，然後分株種植。種植之初要經常澆水，待苗株生長固定，能夠自營生活，吸取水分和養分之後，才能開始施用肥料。肥料種類可以使用豆餅加水發酵，製成稀薄液肥，每10~14天澆灌1次。若土性太粘或肥力太瘠，則可施用有機質肥，使土壤疏鬆。如果種植地之土壤很肥沃，縱使不施任何肥料，生長也很正常。

非洲菊是多年生宿根性植物，新芽容易發生，通常種植1年以後，根基處就會長出許多小株，如果不加以分株，則母株生長受干擾。所以為了更新株勢，必需實行分株繁殖，使每一新株都能獲得充分的生長空間，一般分株時期以3月最理想。

播種法繁殖時，通常在攝氏16~18°的溫度下進行，發芽後再行移植。經過一次移植可使根羣增加，強健的幼苗才能定植到苗圃。

病虫害方面的管理，要注意定期噴藥。非洲菊比較容易罹患的病害有猝倒病 (Damping off)、根腐病 (Root rot) 和葉斑病 (Leaf spot) 3種。猝倒病和根腐病之病徵為造成苗株垂倒，甚而枯萎死亡。葉斑病是由真菌所引起，罹病之葉片產生大的褐色斑點，斑點之外圍有紫色條紋環繞，使葉片捲縮死亡。

虫害方面並不常見，因為非洲菊之植株全部被有短毛，昆蟲不喜歡接近，有防虫之功用，虫害極少。但是有一種叫紅蜘蛛 (Mites) 者，對幼嫩的葉片特別感到興趣，從嫩葉吸取汁液，造成莖、葉的歪曲變形，此種虫害的防治可以噴殺蟎劑防治。

非洲菊的主要用途，是用在插花和花壇的邊境栽植。因其花梗長而硬，開花持久不易凋謝，所以適合於插花。又因其植株低矮，生長期很長 (多年生)，常綠性，全年均可開花，所以適合做花壇的境栽，用來佈置花壇。

