

農業信箱



檸檬樹勢調節

問 我住在潮州四春里，有6分半地，雖為砂礫參半的旱地却也能抽水灌溉。

66年9月中旬種了檸檬，生育正常且樹勢旺盛，在今年開始開花，結果不多，果粒似乎有異樣，請問：

(1)調節檸檬樹勢的重點為何？搭架對檸檬有何作用？

(2)檸檬缺肥與過肥特徵為何？

(3)檸檬是否有促進開花，防止落果的方法？

(4)果實遭受銹壁蝨為害，成為「火燒柑」，應如何防治？（屏東潮州鎮四春里盛春路11號陳貞訓）

答 (1)調節檸檬樹勢的重點在於①施肥②剪枝。搭架可調節樹形，但這可以剪枝代替。

(2)缺肥的特徵為，樹勢不旺盛，結果不良。過肥的特徵為，樹勢過於旺盛，結果不良。

(3)開花、結果最好是順其自然，只要施肥適當，應該會正常的開花結果。如果忽視正當施肥或剪枝等栽培方法，而要用荷爾蒙等藥劑促進開花結果，那是不能維持長久的。最好的方法是：①多施有機肥料（雞糞、堆肥等）②維持正常的土壤酸鹼度（pH6.0左右）。

(4)應在3月底氣溫轉暖時，就要輪流噴布下列藥劑防治：

①25%「克羅苯」乳劑1,000倍液——可維持藥效2~3星期以內。

②50%「錫蟻丹」可濕性粉劑2,000~3,000倍液——可維持藥效

3~4星期以上。

③47%「得拉松」乳劑1,000倍液——可維持藥效3星期左右。（蔡雲鵬）

觀賞鳳梨 花期調節

貴社叢書HV741—2「觀賞植物」第142頁介紹「觀賞鳳梨」可利用電石調節開花，甚感興趣。請問：

(1)幾年生的鳳梨才可利用電石調節花期？

(2)電石的濃度如何調配？用量多少？（台北市北投區郵政信箱8~9號李邦亨）

答 (1)植株需2年生以上，生育良好。

(2)電石的濃度為0.5~1.0%，每株灌注50~100CC。（王武彰）

蜆飼養

問 我有1,500坪沙質土地，水源充足，大部分是泉水。請問：

(1)那種土質較適合養蜆？

(2)泉水會太冷嗎，最適宜生長的水溫是幾度？

(3)豬糞可當做飼料嗎？如用人工飼料，那種最好？

(4)蜆種那裏可購得？每坪放養多少公斤？

(5)多久可收成？

(6)利用流動水還是靜水好？可否混養吳郭魚？

(7)人工採收較費時，可否用機器採收？（宜蘭縣員山鄉向德村圳頭路26~3號林錦標）

答 (1)含沙率60%以上最適合，

成長及色澤較佳。

(2)成長適溫為23~28度C，而泉水溫度較低，全年水溫為25~26度C。

(3)豬糞必須醱酵後才均勻投入蜆池，因蜆為清水養殖，水質不能過肥，不然會引起缺氧而斃死，飼料可用米糠、豆餅粉等，但不宜過量。

(4)請與「雲林縣麥寮鄉許厝10號許擇龍先生」面洽，每坪放養0.5公斤，13,000粒左右幼苗。

(5)須視飼養管理情形而定，一般6~7個月可陸續收成。

(6)以流水較佳，不宜混養吳郭魚。

(7)採蜆宜用機械，亦即一般農戶所使用的抽水機改良者，可以租用。（余廷基）

萬年青分株繁殖

問 萬年青盆栽用小苗，如何大量繁殖？（高雄縣鳳山市鳳山園試分所陳本源）

答 萬年青要用分株法繁殖，才能保持葉片的斑紋。所以苗需由定芽生長，可用B A藥劑促進芽的生長。把老葉除去，露出定芽，塗少量B A膏在此芽上，可促進此芽的生長，待充分生長後才分離母株。此外適當的施肥，也可促進芽的生長。（黃敏展）

