

每株約 450克。以後每年春、夏生長期各施肥一次。另視生長情形，隨時補充施肥。壯齡果園自 3 月開始至夏季採果前，約需施肥 3 次，每次每株施肥量約 450克，然後在夏季與各季收穫之間，再施肥一次，仍需視環境條件與生長狀況而定。台灣低海拔地區，夏季氣溫高，結果期間消耗營養多，葉色每易變黃，需適時補充肥料，否則，將顯著影響以後結果。

防治病虫害

最嚴重的病害是褐斑病，初期在葉面呈紅褐色斑點。潮濕時，斑緣呈吸水狀。病斑擴大時，呈多數同心圓，會使葉片早落。果實的病徵為圓形、下陷紅褐色斑塊，常在中期至近成熟期的果實上見。褐斑病原菌的孢子藉風傳播，濕潤下最易發生。可用 200 倍好速殺或 400 倍大生 45，每 2 星期噴藥一次防治。

最嚴重的虫害是果蠅與紅蜘蛛所引起。果蠅常於果實發育期間在果皮刺孔，日後木質化，造成果實萎縮與脫落。可用 1,000~1,500 倍 25% 的巴拉松水濕性粉劑或 400 倍 25% 的馬拉松水濕性粒劑防治。紅蜘蛛在乾旱季節為害特別嚴重，常發生於葉背面沿中肋部及果實表面，使葉片萎縮變黃，早落。嚴重時，使蔓藤枯死，以及幼果萎縮與脫落。有時蔓頂葉片生長停

止、變形、衰弱，正是紅蜘蛛為害徵候。用 150~200 倍的可溶性硫磺粉防治，嚴重時需每 10 天噴藥一次。平時可每月噴藥一次，預防發生。遇介殼蟲發生時，用馬拉松或巴拉松防治。

成熟果落地採收

百香果實成熟時，由藤上自然落下。雨天需每星期由地面撿拾 1~2 次，以避免果實在地面腐爛。收集果實須注意數點：(1)只撿拾成熟果實。綠熟果實具木質氣味，不適合食用。(2)成熟果實由藤上落下後，失水很快。若以鮮果出售要盡早，否則，失量將達 10~20%。(3)雨天採收的果實易腐爛，要置乾燥蔭涼處。(4)果實要置入開口袋中，並放置蔭涼通風處。如任意處於溫濕情形下，會迅速降低果實品質。(5)加工用果實採收後，迅速洗滌、冷卻，以免腐爛與失重。



水果增收新步數 //

近來有一些農友們將用在蘭花的美國製高級園藝肥料：

花寶二號 HYPONeX 20-20-20

以「葉面施肥」噴霧在葡萄、蓮霧、檸檬、荔枝、枇杷、木瓜、香瓜等果樹上，結果——糖度增加，收量及品質大大地提高，收入劇增，大家笑嘻嘻！

花寶二號不但可與農藥混合使用，省工有效，並且計算起成本却意外地合算，所以愛用者也日日增加了。

◎尚未用過的農友們！早日試試看！

■樣品、說明書、訂購辦法備索。

製造元 美國 HYPONeX 公司
台灣總代理 台和園藝企業股份有限公司
(玫瑰花推廣中心 關係企業)
台北市士林區中正路 104 巷 1 弄 2 號
電話：831-3302·831-3086
郵政劃撥：101360 號

高單位鈣質的來源
——石灰的 100 倍效果！！

《最新奇 特殊土壤改良劑》

鈣元® CALGEN
カルゲン

品質改善與病害預防的新武器！！

- 含有 20 餘種微量元素，能使土壤團粒化、PH 值安定，並能促進土中微生物之增殖。
- 鈣質吸收量高，可強健植物生理機能。
- 提高生產物(尤其是水果)的品質、着色、糖度，可增加收益。
- 對防止水稻倒伏效果甚佳。

日本 ネオゲン株式会社 製造
總代理・總經銷
台和園藝企業股份有限公司
台北市士林區中正路 104 巷 1 弄 2 號
電話：(02) 8313302 ● 8312876