

木耳舍消毒

(1)木耳太空包採收以後，菇舍要如何消毒才不會影响下一期的產量？

(2)如何防治紅蜘蛛為害？(宜蘭縣頭城鎮拔雅里48號魏宗貴)

(1)木耳採收以後，取去太空包。菇舍可比照洋菇舍消毒方法，先清洗菇床，乾燥後再以「五氯酚鈉」(PCP—Na) 50倍溶液噴洒菇床正面背面、床架、四週牆壁及門窗。每100栽培坪施85%「五氯酚鈉」可濕性粉劑4公克。此藥屬強刺激性，用時注意眼、鼻及皮膚。

也可施用37%「福爾馬林」，每100栽培坪用200CC，稀釋50倍噴射。

(2)木耳太空包經過殺菌，所有洋菇害虫(包括紅蜘蛛)，經77°C 30分鐘均可殺死。因此太空包的紅蜘蛛是由土壤菇床再感染而來。在放置太空包前用殺蟎農藥遍洒菇床及地面，可減少紅蜘蛛感染。(鄭寬文)

茭白筍品系

(1)我有二分田全種茭白筍，自去年農曆12月種下，到今年4月中旬，有的抽心不結實，有的黑心外寬不白，產量低，請問應如何管理，才可改善？

(2)筍田水應保持多深？(台中東勢鎮隆興里東坑街45號張阿業)

(1)所種的茭白筍屬於不良品系，不能自管理方面加以改善，宜早廢耕，重新選用優良系統栽培。

購買茭白筍苗前，必須先赴現場觀察植株的性狀及生產力，然後才向具有優良系統的農家分讓。

(2)應經常保持10~12公分深。(王進生)

殺草劑選用

我的果園長滿了「紅莖豬母菜」，每次施「巴拉刈」後，只有少數的葉會枯死，過不了幾天又會長得很茂盛，真使我頭痛。請問應用何種殺草劑，如何施用才可根除？(屏東縣潮州鎮泗林里通潮路15號陳上遠)

「巴拉刈」(克莠踪等)殺草劑對含有葉綠素的植物體才有效，因此滅除「紅莖豬母菜」的效果差。請改用「嘉磷塞」(蘭達或年年春)乳劑。

使用方法為每公頃施藥3~4公升，加水稀釋150~200倍，以噴霧器利用晴天噴洒於雜草莖葉上。本劑可殺死大部份植物，噴洒時切勿噴到作物植株上。

藥效較「巴拉刈」慢，潤葉雜草於施藥後約3~5天才開始枯死，尖葉草(如土香等)須一星期以上才開始枯死。(林寶霖)

荔枝果腐病

每當荔枝接近採收期，常發生果實表皮局部乾枯的現象，嚴重時落果慘重，損失不輕。有人說是藥害，又有人說是水傷。請問這是何病？如何防治？(彰化縣社頭鄉山湖村清興路110號陳德清)

這是果腐病，病原由土壤傳入，果實幼小時即感染，漸漸使果殼變黑乾枯。如遇下雨，病

勢特別猖獗，引起嚴重落果，為近年來發生甚為普遍的病害，須從下列各方面注意防治：

(1)噴藥：果實發育期中，每週噴藥1次，藥劑為5—5式「波爾多」液、「大生45」500倍液、或「大富丹」800倍液，果實將屆成熟時，尤需勤噴。

(2)剪枝：低垂觸地的枝條須剪除，以免病菌由土壤傳到樹上。

(3)舖草：荔枝樹冠下舖草，可隔斷病菌從土壤中隨雨水濺到果實上，傳佈病害。(黃弼臣)

吳郭魚的泥土味

我飼養的吳郭魚為何食用時會有泥土味道？有何補救方法？(屏東縣竹田鄉竹南村竹南路2號何德德)

吳郭魚食用時有泥土味，乃因池中底質有機泥，或給飼有機質肥料所影响。引用已污染的水源、施放有機肥料、投餌過多，殘餌腐敗或魚池用舊了，底質慢慢的堆積有機泥都會污染到養殖池魚味道，請檢討發生原因，再予以改善。

如為池底污泥所害，清池時要將污泥清除，盡量晒乾，應施放石灰加予消毒。不要再用有機質肥糞，改投人工餌料。

現在只有將所捕的魚暫時蓄養於水泥池中，用井水加予沖流一星期左右，似可消除泥土味。(郭河)

