

形即是忽略了花粉雄株的重要性，而與其他扁蒲品種的雄花發生雜交，縱然有很好的葫蘆母株仍使果形改變。



人工授粉

3.套袋、人工授粉

開花前一天傍晚，用紙袋、橡皮筋、夾子或迴紋針將雌雄花套住，防止花粉雜交。胡瓜、冬瓜於次晨朝露乾後人工授粉，扁蒲則於下午5時後人工授粉。授粉後雌花仍需套袋4~5天，並以標籤標示，註明日期。

4.授粉後的管理

每株留果數不可太多，以免因養分競爭關係，種果不易成熟，種子不能充分發育飽滿。胡瓜每株留2~3果，冬瓜1~2果，絲瓜3~4果，扁蒲以大形果每株5果、小形果10果為原則。授粉後將其餘果全數除去，使種果能得到充足養分，發育良好。

5.種子採收

胡瓜授粉後約50~60天，果實完全成熟後採下追熟5~7天，剖開果實將瓜肉及種子一起取出，置於桶內發酵12~24小時，用水洗出種子陰乾。冬瓜開花後45天，果面毛茸脫落或果面現白蠟狀、果梗呈現褐色，即為採收適期。採收後追熟2~3星期，取出種子於20~25°C下慢慢晒乾，溫度不可超過30°C。扁蒲開花後50~90天，果梗木栓化、皮色淡白、毛茸脫落，採下追熟半個月後，剖去表皮晒乾取出種子篩選之。絲瓜成熟後將皮剝去晒乾，打落種子風選之。

6.其他注意事項

選留種株要注意選無毒素病的植株，發病株周圍3~5株均不宜作留種株，且鄰近植株的花粉不可用來授粉。

大克菌靈[®] (大克爛)


農藥許可證：經市進字第1151號

50%可濕性粉劑




作物種類	病害種類	防治時期	使用倍數	施用法
草 菇	菇床白絹病 及雜菌	菌種成活後 未發菇前	3000	每坪用稀釋液1公升，雜菌嚴重時採用2000倍，但不可用1000倍
萐 苞	菌核病	種後 20~30天 發病初期	2000	每7~10天一次 連續3~4次

大克菌靈防治白絹病效果



大克菌靈對草菇增產效果



製造工廠：
英國 The Boots Company Ltd.
總代理：

嘉寶有限公司
台北市郵政信箱3339號