

秋作蔬菜育苗

## 病虫害防治

• 王進生 •

1. 十字花科的黑腐病、黑斑病、黑斑細菌病及根朽病（俗稱黑脚病），病菌由種子傳染。番茄的萎凋病、甜椒的炭疽病等也由種子傳染，所以種子宜用蓋普丹可濕性粉劑或利保果可濕性粉劑<sup>3/1000</sup>拌種消毒然後下種，而避免由種子傳播病菌。

2. 在假植床期間，宜定期每隔7天左右，噴射大生45~400倍液或安收多500倍液或蓋普丹500倍液，預防各種病害發生，例如露菌病等。

3. 常見的害蟲有夜盜蟲、小菜蛾、蚜蟲等，除十字花科蔬菜外，茄科蔬菜例如甜椒、番茄、茄子易由蚜蟲媒介而引起毒素病。可用白色PE覆蓋防治，如有銀色PE網更佳，因蚜蟲最忌銀白色。經過覆蓋的苗株，因無蚜蟲，很少發生毒素病。

床土用好年冬粒劑處理當可減少蟲害，但仍要注意，並須於早期施藥，撲滅小菜蛾、蚜蟲、夜盜蟲及白粉蝶等。

4. 為害苗株的尚有軟蠶、草蠶等，但很少有人注意，往往引起大害。在假植床周圍撒施聚乙醛，寬度20公分，用量每平方公尺為一公克，同時也可以防除蝸牛。


5. 定植前1~2天，必須噴射殺菌劑及殺蟲劑防治病蟲。因定植後苗株未完全成活前，不宜施藥。如苗株附着各種病蟲，在定植後3~4天苗株衰弱時會猖獗繁衍，而施藥往往引起藥害，事雖小但影響大，所以定植前的施藥不宜忽略。



## 電子空氣過濾口罩

售價300元 郵政劃撥129600號

農友噴灑農藥，防止農藥吸入中毒。  
化學工廠員工，防有害氣體吸入體內。  
礦工及勞工，防止石粉末吸入肺部，  
可預防職業病發生。



《徵求各地經銷商》  
台專申字6721194號

甚佳企業有限公司

台北郵政68~1642信箱・電話：(02) 5814719