

和塑膠布門雙重阻隔，以減少外界虫、雜菌的飛入。在抽風機進風口處，裝置64目的細紗網以防止菇蠅被吸入，這也是菇農常疏漏之處，尤其舊菇舍，紗網多不存在。

菇舍的通氣紗門，應在外向安裝塑膠布門，以便在菇舍燻蒸消毒處理時或後醱酵時，加以關閉增加密閉性。菇舍完成後，在四周挖成環溝，以阻止其他害蟲侵入菇舍內，另在進風口和門窗處噴60%大利松乳劑50倍液。

### 三種菇舍消毒法

目前推廣的菇舍消毒方法有3種，菇農可擇一而從，千萬不可不消毒菇舍即行栽培。因病害的發生並沒有一定的周期，雖然有時未經消毒也沒有病害發生，也只是僥倖而已。

新菇舍消毒前，應先將菇舍打掃清潔，可能狀況下以水沖洗，並打開门窗使通風乾燥，再行消毒處理。舊菇舍使用前，要將前期栽培的廢堆肥完全清除，有破損處加以修補，使保持密閉，盡可能以水沖洗床架和四周，使附着的灰塵或黴菌洗刷乾淨，並通風乾燥，將稻草、塑膠布或尼龍網鋪於床上，一併消毒處

理。茲將3種消毒法分述於後：

#### 福馬林添加高錳酸鉀燻蒸法

於福馬林液中加入高錳酸鉀，會產生煙霧狀氣體，對一般空氣中的微生物雜菌有良好的抑止生長作用。且因呈煙霧狀，可在密閉環境下充滿整個空間。竹搭菇舍夾隙甚多，一般藥劑噴灑，死角均無法清除，燻蒸則無孔不入。

標準50栽培坪，須用700cc的福馬林加入350克的高錳酸鉀。有時可將一非金屬容器置菇舍正中央，有時可分前、中、後3處置於走道，再依序放3三等分的高錳酸鉀，高錳酸鉀可以衛生紙包好投入福馬林容器中。發煙後操作者立即離開，再將門密閉，同時檢查菇舍四周有無煙漏出。通氣口常常忘記關閉，而使煙霧從氣孔排出，導致燻蒸氣體量不足，無法達各角落，而失去燻蒸效果。

福馬林有刺激臭味，故菇農多隨便操作，甚至以噴霧器將福馬林噴灑於床架及菇舍內，可是由於強烈的刺激性，菇農常半途而廢，無法噴灑到整個菇舍，反而影響消毒效果。

燻蒸處理24小時後，將通氣門窗的外圍塑膠布門

### 系統性殺菌劑

# 霉敵<sup>®</sup>-340

#### 可濕性粉劑

- 系統性殺菌最完全！
- 最速效！
- 最安全！

® 註冊商標

### 廣效性燻烟殺菌劑

# 霉敵<sup>®</sup>

#### 燻烟片劑

- 最新型燻烟殺菌劑！
- 殺菌最徹底！
- 無臭、無味、最安全！
- 省時、省工、最方便！

MSD

美國默沙東(默克)藥廠  
MERCK SHARP & DOHME INTERNATIONAL

台灣總代理：

美商美國新美公司 U.S. Summit Corp.  
台北市八德路三段20號 (台資大樓八樓) TEL: 2719163 ~ 8