

打開，並以抽風機送風，使菇舍內殘餘氣體排出，千萬不可將紗門打開。菇舍內無福馬林味道時即算消毒完畢，可將堆肥上床，進行發酵。

五氯酚鈉 (PCP-Na) 消毒片

PCP-Na 為木材防腐的處理劑，對一些空氣中的雜菌也有良好的清除效果，由於沒有特殊刺激臭味，且價格低廉，很多農民喜歡使用。但是在堆肥上床前需以清水沖洗，甚為繁瑣，故農民多只噴不洗。

使用PCP-Na 消毒菇舍，同樣需先將菇舍沖洗乾淨，再以高壓噴霧器，將50倍液噴於菇床及四週，噴完後將門關閉，經5~6天後打開門窗使通氣，至菇舍內無藥味時，即可將堆肥搬入菇舍上床。PCP-Na 的燻蒸作用較福馬林為弱，所以密閉時間較長，利用此藥劑處理，在操作上要提前進行。

霉敵烟燻劑處理法

霉敵烟燻劑是一種具燃燒性的烟燻片劑，每斤重60公克，淺綠色，一經點燃則不斷燻出霉敵藥劑的微粒塵狀物，藉此以覆蓋室內所有物件的表面，以達消滅黴菌的目的。此片劑在密閉包裝中有效兩年，藥劑

安定。

目前的推廣方法為每棟標準菇培舍(50坪)，於菇床覆土後、發酵前，將5~6片烟燻片劑平均置於菇舍，在密閉狀態下燻蒸24小時，以預防褐斑病和腫柄病。

但此片劑也可用於菇舍消毒，試驗結果具有良好的消毒效果，且處理簡便，無任何刺激作用，用小白鼠試驗，在密閉容器中行燻蒸無任何不良反應。使用步驟，也如前述的菇舍清潔處理，清除完畢的菇舍，經通風乾燥後，關閉所有門窗，燃燒前應等舍內塵埃自動下沉，而後置於防火器皿上如鐵片、磚等，再以火點燃該片劑邊緣，等陸續產生煙霧才算燃着。此時人應迅速離開菇舍並將門密閉24小時，再打開門窗，通入新鮮空氣，堆肥上床。

使用本片劑，注意勿使藥片潮濕，打開包裝後立即燃着，不可久置以免失去自燃性。不要用力敲撞片劑以免破碎而熄滅。

綜上所述，菇舍的消毒，是獲得高產量、優良品質洋菇的第一步，雖屬老生常談，但農友多有疏忽之處。一分謹慎即少一分損失，希望此菇舍消毒方法，能提醒您重視「消毒菇舍」。

美多農-A



富多農-B

農作物培養基營養素(人畜無害)

效果：

- ※促進萌芽、培養發育
- ※提高品質、增收產量
- ※促進生長、防止落花落果

主成份：

- ※芳香族硝基化合物

- ◎經銷商遍佈全省
- ◎說明書備索，技術指導
- ◎現貨供應

經濟部工證台建字第60809號

適用作物：

- ※蔬菜、果樹、水稻、豆麥、菸草、茶葉、花草、育苗、雜作等等作物



台灣功用企業有限公司

總公司：三重市自強路三段七巷十二號

TEL：9812979

工廠：台中縣大肚鄉太平路三號