

蛋鴨飼養管理

陳晉蒼

蛋鴨，一般農民稱為菜鴨，體質強健，耐粗食，產蛋率高。自出壳後120~150天開始產蛋，每隻平均年產250個，每個蛋重平均70公克，飼養管理良好，可繼續飼養2~3年後淘汰。

設計良好的鴨舍

位置：排水良好，車輛容易通行，周圍以寧靜為宜。

面積：1千隻的鴨舍需40~45坪，運動場90~100坪。水池長30公尺，寬2公尺，深25~45公分。


地板：舍內水泥地板要有鴨床，可省清掃時間和勞力。泥土地板鋪稻草須常更換，如沙土來源充足時，地板鋪沙也很適合。運動場可鋪細石或沙，磚與水泥地則需鋪有鴨床。

溫度看天氣而定，一般超過3周齡後沒有寒流的天氣，室內只要有墊料（稻草），就不必保溫。

初生小鴨因怕冷容易堆在一起，為防止積壓，小鴨須隔堆，使用三夾板或竹罩，每40隻隔成一堆。如保溫良好，3~5天後就取消隔堆，但如發現小鴨有堆積，仍須隔堆，以策安全。

飲水及餵料：小鴨進入時，不要放入水池洗浴（一般農民習慣將小鴨放入水池洗浴，根據試驗有不良效果，要加以改正。）須立即供應加抗生素及維他命等藥品的飲水，飲水要使用井水或自來水，池塘水不宜使用。飲水過後1~2小時餵料、任食或每天餵5次均可。

洗浴：保溫期不宜洗浴，天氣寒冷更不宜。菜鴨喜歡戲水，如因天氣炎熱或羽毛沾有糞便不潔時應洗



重視育雛工作

育雛前準備：小鴨進入前1星期，應將育雛室或育雛場地及器具，消毒清洗晒乾，並準備新鮮墊料（稻草）及保溫設備。

保溫與隔堆：小鴨剛進入時，除大熱天外，均須保溫。第1天保溫溫度為34°C，後兩天可降低1°；1周後室內28°，2周後室溫24°時，則不需保溫。保

浴。當天氣寒冷時，洗浴時間要短約5分鐘，並備有新鮮稻草，洗浴後小鴨以啄整理羽毛，羽毛整理乾燥後蓬鬆乾淨，對小鴨有益，羽毛未乾前，勿趕入舍內保溫。

墊料：一般使用稻草或鋸木屑，小鴨在一周後，糞便逐漸增加，容易污染體羽。鴨常以啄整理腹部羽毛，如果腹部羽毛沾有糞便，很容易因此而脫落，保溫力減低，影響發育，容易遭疾病侵襲，因此墊

料及地板要保持乾燥與清潔。

中鴨飼養管理

換毛：小鴨15日齡左右，初生毛逐漸脫落長出新毛。換毛次序由尾部開始，而後是體側、腹部、頭頸、背部，最後是翅膀，每階段約為10天左右。若管理不善，則換毛延緩並且發育不良。

更換飼料：3周齡以上的小鴨生長快，食量增加，不要再使用小鴨飼料，應改用中鴨飼料。更換飼料時，應於7~10天中逐漸更換。在6周齡以前不要使用粗糠，如須使用時，仍以粗糠粉為宜，在此時期使用粗糠，常發生不良效果。

預防啄毛：小鴨在5~6周齡時，翅膀開始長出主翼羽。當主翼羽的羽軸根長出時，因羽軸根內充滿血液，很像韭菜的地下部，農民稱「韭菜把」。鴨羣中有些本來就帶有啄毛癖的，專喜歡啄剛長出的主翼羽（羽軸根），啄毛癖會傳給其他鴨伴，因此常於一夜之間，鴨羣發生啄毛，被啄厲害者會死亡。

引起啄毛癖的原因很多，主要為鴨舍不清潔、過份密飼、飼料配合不平衡、管理不良所引起。如發生啄毛，輕度者（在鴨羣中僅有少數者）不必理牠，嚴重者應立即剪嘴。

剪嘴時，避免驚動其他鴨羣而互相踐踏，應以30隻圍一圍，個別使用剪刀，將鴨嘴上顎前端彎下部份，剪掉約0.3公分，並以能看到有微小的注血點為度。鴨羣剪完後，要立即改善誘起的原因。

限食：7周齡後，飼養管理良好，每隻鴨的主翼羽均已長成，這時羽軸根內血液消失，羽弁（羽葉）已長一半長度（鴨農稱半撇），即應開始實施限食措施。如鴨羣管理失當，一般鴨均尚未達「半撇」，即主翼羽未達一半長度，雖達7周齡，也不能限食。

限食主要目的，為延長鴨羣初產時間，初產整齊，產蛋壽命延長，節省飼料，因此限食在蛋鴨管理項目中佔重要一環。

限食的方法有2，一為限質，一為限量。限量方法即鴨羣每天的食料量減少，減少的程度隨着日齡的增加而增加，但必須注意鴨的日齡增加，食料量也增加，因此限量是以當時全日食料量的百分比來計算。

限質方法，即自第7周齡（49日齡）起降低飼料品質，限質的方法為目前鴨農廣為採用。一般是使用玉米粒、大麥粒及混合飼料，另加粗糠等將鴨餵飽。這種限質方法，一般鴨農均無一定的標準，因此往往過度限食，而影響日後的產蛋能力。



雜鴨（薛）

委託飼養是以鴨的日齡數計資，因放牧時間過去，或檢食落谷不足，常發生限食過度，應加以注意。如自行飼養，又常發生因限食不足而提早產蛋，因此限食期中應注意下列幾點：

- (1)每日觀察鴨羣狀況。
- (2)測定全日食料量，每周至少一次。
- (3)遇到寒流或長期下雨（3天以上）或颶風等惡劣天氣時，停止限食。
- (4)檢查鴨的肥瘦度，即每周自鴨羣中隨意捉摸幾隻。
- (5)死鴨要紀錄。
- (6)觀察羽毛情形，可測知鴨羣健康狀況。
- (7)注意疾病防治工作。

放牧：放牧養鴨可節省飼料費，如在稻谷或花生收穫期，每隻鴨可節省飼料費50~60元，因此農民養鴨均於春秋兩季進小鴨。小鴨7周齡最適合放牧，天氣良好可提前1周。放牧期間要注意放牧區內的檢食落谷量，並檢查放牧區內是否有動物屍體，發現後應加以埋藏，防止鴨羣啄食。

白天檢食不足時，於夜間應補充飼料。經過放牧的鴨羣，體格強健，經得起氣候變化的考驗，抵抗力增強，對將來產蛋能力很有幫助。

圈飼：放牧時間過去，或人力不足而無法放牧，可將鴨羣圈飼在鴨舍或河川魚池邊上，如利用鴨舍圈飼，應盡量加大運動場，使鴨有充分運動範圍，切忌密飼。圈飼應注意濃飼礦物質及鈣、磷之類，以防飼料的不平衡，發生不良後果。

淘汰：在中鴨時期發育不良者，日後也無法發揮產蛋性能，因此鴨羣中有健康但發育不良者（鴨農稱鴨尾），應加以淘汰，免得日後因低產才淘汰，增加了鴨羣的折舊費，損失更大。

（下期將繼續說明產蛋鴨的飼養管理。）