

，故有「褐色心腐病」之稱（有時髓部會變成黑色）。甚者蘿蔔外形扭轉變形，抽苔困難，或者在種子成熟前植株腐死。（見34頁）

豆薯：

豆薯外形無異狀，但心部變褐色，並橫裂成乾腐的空洞。（見35頁）

球莖甘藍：

球莖中心橫裂成空洞，空洞的壁面呈黑褐色，心肉帶褐色。

嫩莖高苣：

新葉葉脈和葉緣生長緩慢，葉面因而繃起，葉緣常反卷成匙形。葉色呈濃淡不勻的斑塊，極似嵌紋毒素病，由葉尖開始生褐色斑點，繼而葉尖開始焦枯，擴及葉緣。頂芽生長稍受抑制，由葉腋發生多數側芽，莖部中心先由近地面基部發生水漬狀病症，漸次變為褐色濕腐並橫裂成空洞，最後潰死。（見35頁）

芹菜：

葉柄外側發生橫裂紋，裂面變褐色，葉柄內側表

皮呈木栓狀，嚴重時心部枯死。西洋芹菜比較容易發生缺硼症。（34頁。）

芥菜：

葉柄（中肋）外側橫裂，裂面呈褐色。



芥菜缺硼症

結球白菜：

球葉中肋外側發生橫裂紋，裂口褐色，有時外葉中肋內外側發生羣聚黑色斑點，表皮生木栓狀不規則褐斑。（見34頁）

專營進口

歐美優良配種肉鴿

※幼鴿、成鴿、※特價供應

超大型配種觀賞肉鴿
大型配種肉鴿
觀賞鴿

歡迎參觀批評



鴿糞、飼料、
藥品、用具、
養鴿全書、
乳鴿、成鴿、
買賣介紹

嘉大肉鴿配種場

服務處：嘉義市台林街205~8號 陳金獅
電話：(052) 286577