

秋頂端出現黃、深紅、鮮紅、紫紅色等葉。花生於葉腋，穗狀花序，無觀賞性，但結實有利播種繁殖。原產地印度及東南亞。

②柳葉雁來紅 *A. Salicifolius*：株高約1公尺左右，葉為緋紅色細旋而下垂，入秋有如燃燒的紅炎，更增加艷色。

③三色雁來紅 *A. Splendens*：莖高70~100公分，葉色由赤、桃、黃三色而成。葉為長卵狀披針形，入秋亦從葉腋叢生多數綠色小花，沒有觀賞價值，但可採收種子以供實生。

栽培和繁殖——

雞冠花和雁來紅，原來都是熱帶地方原產，園藝上雖屬春播草花，但播種提早，生育還是緩慢，所以播種期以4月底至6月為宜。尤其是雁來紅，夏季乾燥的地方，過於早播，未及秋天花叢已大，葉的發育傾向衰弱。

以直接播種為佳，切花栽培的珠牙雞冠，如過於放寬間隔，莖的生育粗大且花球也大，反而降低品質，因此，宜80公分寬的植畦，播種2行，株間各間拔為10公分。

雞冠花對抗乾燥力甚強，任何場所均可栽培。雁來紅的栽培，大致相同，但移植較雞冠安全，幼苗期便耐移植。喜好陽光，宜注意日照良好。如株莖過高，遭逢暴風雨，就有倒地的危險，因而有豎立支柱的必要。

雁來紅以秋冷時觀賞紅葉為目的，所以北部宜早播，南部應行晚播，管理上不需摘心或疏枝。

雞冠和雁來紅的繁殖法，專賴實生。種子的採收應於結實後，成熟而種子未散落前，將全穗剪離日乾，乾燥後即容易打落，貯存至次年春天播種。種子呈黑色而細小，種皮堅硬。播種前日先浸水一夜，下種後的發芽便很整齊。



上：雞冠花(黃瑪珠)

下：雁來紅(廖敦新)



日本三共株式會社榮譽出品

立枯病特效藥!!

全國唯一蒙農林廳正式推廣之水稻秧苗立枯病防治藥劑

立枯靈 30%液劑

(殺紋寧·日名：タチガレン)

殺菌並促進根的發育!! 抗寒害(凍傷)!!

一種農藥多種效果!!

登記證：經市進字第478號

立枯靈的特長

- 用立枯靈：確實防止立枯病、及立枯性腐敗症之發生
- 用立枯靈：可抵抗寒流及早晚溫差大時所造成之凍傷
- 用立枯靈：可增強根部活力、促進生長確保培育出健康苗
- 用立枯靈：能促使移植後提早成活並使生長力旺盛
- 用立枯靈：安全又簡便、可與他種農藥混合使用

國外資料

(僅供參考)

立枯靈在國外尚用於防治林木苗木立枯病、瓜類苗立枯病、甜菜立枯病、蔬菜苗立枯病、康乃馨立枯病、甜椒立枯病、菸草猝倒病、蕃茄苗立枯病、萎凋病、草莓苗立枯病、大豆、紅豆、菜豆等豆科作物白絹病、菌軟腐病

台灣總代理 中國化學製藥股份有限公司 台北市襄陽路23號 電話：3816740~9

總經銷 寶昌貿易股份有限公司 台北市敦化南路514號之3三樓 電話：7052414 7050155