

園藝新知



基肥於整地時施入畦中，或撒播均勻於土面後做畦。第1次追肥於成活後7天進行，第2次於結果前施行，第3次追肥於抽苔前，第4次於花謝後行之。

表：甘藍採種施肥量 10公畝/公斤

肥料	全量	基肥	追肥			
			第1次	第2次	第3次	第4次
硫酸銨	120	80	15	10	10	5
過磷酸鈣	74	49	10	5	5	5
氯化鉀	30	20	5	—	5	—
棚砂	1	1	—	—	—	—
苦土石灰	100	100	—	—	—	—
堆肥	3000	3000	—	—	—	—

每施肥一次宜行中耕除草。

生育期應充分灌水，天氣乾燥時每隔5天灌一次水；結球期應減少灌水；開花結莢期畦面應避免過份濕潤，以防黑斑病發生。

隔離距離須足夠

採種過程中，品種隔離為採種成功的重要因素之一。採種圃如果隔離距離不夠，容易造成與異品種雜交，影響種子品質及純度。甘藍菜屬十字花科蕓苔屬，與球莖甘藍、青花菜、花椰菜、芥藍菜、抱子甘藍容易雜交，但與白菜類、蘿蔔、燕青、芥菜等不會雜交。據Webster (1949) 的研究認為，甘藍原種圃隔離距離應在1.6公里左右，採種圃400~500公尺的距離即可。為安全隔離起見，筆者建議甘藍採種圃的隔離應在1000公尺以上才安全。又據 Taylor (1942)

電子空氣過濾口罩

售價300元 郵政劃撥129600號



農友噴灑農藥，防止農藥吸入中毒。
化學工廠員工，防有害氣體吸入體內。
礦工及勞工，防止石粉末吸入肺部，
可預防職業病發生。

《徵求各地經銷商》

台專申字6721194號

甚佳企業有限公司
台北郵政68~1642信箱
電話：(02) 5814719

經銷商：
林章一 台東市寶桑路248巷11號 電話(089) 326262
尚德農藥行 宜蘭縣員山鄉尚德村87號 電話(039) 325032
何德 花蓮縣富里鄉富南村48號