

在植株的周圍也可以發現一些掉落的種子，自行萌生的小苗。枝插，以取較老熟的枝條為適宜，切成15公分左右的長度，斜插在沙床上，大約2、3個星期就可生根成苗。根插，也以採用稍粗壯部份較佳，剪成10~15公分長，平埋在土中，3、4星期後即可萌生分蘖。移植懸星花以後，常常在原栽植地的附近，發現許多小苗，大多數就是由留存在地下的殘根萌發而來的。

前中興大學校長劉道元先生的庭院所種的懸星花，繁茂的枝葉攀過圍牆，不僅路人為之側目，連放學回家的小朋友，都因為它美麗的花朶和果實，而常駐足圍觀，甚至動手採摘，弄得劉校長不得不在牆角輪流掛上「花供行人看，行人請愛花」和「小朋友喜歡花，保護花」的告示牌。在台灣委屈將近四分之一個世紀的懸星花，在那裏總算揚眉吐氣了！



懸星花 (左：淡紫紅色花朵 右：鮮紅的果實)



日本三共株式會社榮譽出品

立枯病特效藥!!

全國唯一蒙農林廳正式推廣之水稻秧苗立枯病防治藥劑

立枯靈 30%液劑

(殺紋寧·日名：タチガレン)

殺菌並促進根的發育!! 抗寒害(凍傷)!!

一種農藥多種效果!!

登記證：經市進字第478號

立枯靈的特長

用立枯靈，確實防止立枯病、及立枯性腐敗症之發生
 用立枯靈，可抵抗寒流及早晚溫差大時所造成之凍傷
 用立枯靈，可增強根部活力，促進生長確保培育出健康苗
 用立枯靈，能促使移植後提早成活並使生長力旺盛
 用立枯靈，安全又簡便，可與他種農藥混合使用

國外資料

(僅供參考)

立枯靈在國外尚用於防治林木苗木立枯病、瓜類苗立枯病、甜菜立枯病、蔬菜苗立枯病、康乃馨立枯病、甜椒立枯病、菸草舞病、蕃茄苗立枯病、萎凋病、草莓苗立枯病、大豆、紅豆、菜豆等豆科作物白絹病、菌軟腐病

▲ 台灣總代理 中國化學製藥股份有限公司 台北市襄陽路23號 電話：3816740~9

⑤ 總經銷 實昌貿易股份有限公司 台北市敦化南路514號之3三樓 電話：7052414 7050155