



泥鰱防逃

● (1)我飼養有5分地泥鰱，平時皆躲入泥土裏。請問有何方法可以探知泥鰱死亡、逃逸或減少？

(2)冬季氣候寒冷，泥鰱能否抵擋？有何方法可預防霜害？（嘉義縣溪口鄉溪西村中正路242號張惠祺）

● (1)關於這方面，研究極少。一般而言，如管理正確，放養的魚無疾病，或是水源未受農藥等污染，泥鰱死亡情況相當少，反而是由於逃逸所造成的損失較大。因此池四邊宜有妥善防逃設施。

如要確知有無逃逸，可利用固定餌料場及定時投飼原則，在投飼時檢視其量，即可明瞭大概。

(2)由於泥鰱會鑽土，地底若有10公分左右的泥土，寒冷時，會鑽入土中冬眠禦寒。

可以用地下水流水，提高水溫預防霜害。（彭鏡洲）

洋菇下種後管理

● (1)今年洋菇覆土後，先洒水並以「萬力」噴洒。但第1期菇仍發生褐斑病。請問應如何防治？

(2)洋菇下種後至第1期菇採收，這段期間應如何管理？

(3)下種後門窗關閉，菌絲發育旺盛，產生大菇。但却引起腦菌病，請問應如何防治？

(4)開窗通風以預防發生腦菌病，但却大量發生小菇，請問應如何補救？

(5)覆土洒水後幾天可產生菇信？氣溫超過22°C時可否開門窗通氣？（台南縣下營鄉中營254號陳清草）

● (1)褐斑病1次施藥未能完全根絕，應再繼續施藥。發現病菇應即清除，裝入塑膠袋中予以燒燬，再於發病處噴注較多的藥劑。為避免發生抗藥性，可用「腐絕」等推廣藥劑交替使用。

(2)洋菇下種後，1~3天內，如室溫在25°C以下，菇床溫度在30°C以下時，應盡量少通風，只需在菇舍背風面開1~2個小窗，使自然換氣。待菌絲伸達堆肥後，可以漸次增加通氣量。為避免通風時，使堆肥表面過份乾燥，可酌予覆蓋1層報紙。

一般下種後，約2週左右，即可覆土。覆土前在菇床表面洒1次水，尤其菇表面堆肥過乾，更是有此必要，這次洒水有助於小洋菇整齊形成。覆土1週左右開始洒水，開始洒水前最好菇床在20°C以上。如床溫過低，子菇形成會較少，所以可開窗實施內循環，使床溫上昇後再開始洒水。

開始洒水後少量換氣，多實施內循環，在菌絲部分可見於土表，且土表內2公分左右處已有大量菌絲時，再噴1次水，並通氣降溫，發現小菇體如米粒大小時，在土表上者，應予補土，室內保持高濕度，菇床只能小量噴霧，千萬不可大量噴水，否則會造成小菇的死亡。

小菇長大如黃豆大小，可以漸次增加噴水，菇體大至姆指大小以後，如氣溫在16°C以上，1天可

以噴4次水，使覆土濕透。洋菇採收後，不宜再噴水，使順利產生第2期菇，再按上述方法管理。

(3)菇床溫度23°C以上時，發生腦菌的機會隨之增加，因此要設法通風，或降低床溫。如發生腦菌時，須將有病的菌床材料清除，用藥很難達到良好效果。

(4)菇床表面發現大量的小菇，即表示通氣量不足。補救的方法，是用覆土材料調妥水份含量後，將所有小菇體覆蓋1層，並增加通氣量。待菇冒露出上面時，再予大量的噴水及通風管理。

(5)菇信一般在覆土10天以後發生，但有時因溫度較高也會提早，氣溫22°C以上，通氣是對的。溫度較高時，洋菇呼吸量較大，可刺激洋菇生產的氣體，在覆土層內往往已足夠，所以洋菇可以照常發生。（宋細福）

甘蔗留頭

● (1)甘蔗採收時，到底留頭部（蔗頭）愈長較好，或留短一點較好？（雲林縣斗六鎮三平里北平路55巷109號黃武信）

● (2)甘蔗如果要繼續留宿根，採收時須將地上蔗莖全部刈掘，留在土中蔗頭高度，僅2~3台寸左右。刈掘時，不宜參差不齊，短小蔗株及小蘗，也須一律砍去，蔗株切口應注意平整光滑，如此甘蔗萌芽才會茁壯。

如果不留宿根，採收時須將蔗株白地下分蘗基點（俗稱葫蘆頭）完全掘出。（林宗然）

