

省不宜施行。

因為母樹的優良形質可直接遺傳後裔，所以母樹的選擇應加慎重。每株母樹採取5~6穗即可，採穗部位以樹梢起5、6枝以下為宜。插穗只採用主枝先端，側枝的先端因成活生根率低，所以不宜採用。

自採枝至扦插的時間，應力求迅速，以保持插穗的生機而提高成活率。柳杉插條，最好先選擇具有優良形質的優型樹，予以插條繁殖後，建造採穗園，以供應插穗。

### 台灣二葉松本省原產


台灣二葉松 (Pinus taiwanensis Hay.)，本省稱松蘿、松柏、新高赤松，是本省原產。分布在中央山脈和支脈，海拔700~3,200公尺地區，常成純林，尤以橫貫公路大甲溪沿岸最多。

本樹種屬陽性樹，全島海拔在700~3,000公尺的地區適宜栽培。可耐乾旱和瘠薄土壤，是最適於草生地與土層淺薄陽坡林地造林的先鋒樹種。能耐風，任何土壤均可生育，但應避免北向、東北向或陰濕地。本省以往很少栽植，直到民國50年以後，各林區才推廣造林。

### 選擇適當種源

採種：台灣二葉松天然垂直分布極廣，其間生長變異亦大。採種時應考慮採用適當種源種子，應採自與造林地海拔高度相差不遠之地的優良母樹，切勿將採自高海拔的種子，使用在低海拔造林地。

種子應自優良母樹採取，採集適期為10~12月間，高海拔地區因開花結實較晚，故採集期也較遲。球果採集後在陽光下曝曬，使果鱗開裂，種子脫出後收



二葉松塑膠袋育苗

## 果蔬農友大福音!! 從開花、結實到豐收——儘管找台和!!

葉面施肥·亦可混合農藥使用

◆詳細資料歡迎函索◆

有機質 磷鉀肥 魚精 <b>開花肥</b> 0-10-10	促進花芽分化——果樹催早花 效果奇佳 花蕾肥碩、開花旺盛——着果良好 結實大 美國ALASKA魚肥公司 出品
-------------------------------------	--

果樹·蔬菜用 <b>花寶 (HYPONeX) 系列!!</b>	
<b>花寶二號</b> 20-20-20 促進果實肥大 糖度增加	<b>花寶三號</b> 10-30-20 促進開花 增加着果率 結實良好
美國The HYPONeX Co., Inc. 製造	

地面撒佈 使用方便	<p>〈最新奇 特殊土壤改良劑〉 ——改善水果品質的秘方——</p> <p>促進着色 提早成熟 糖度增加 強健植物生理機能 增強貯藏力</p> <p><b>鈣元 CALGEN</b> カルゲン 日本ネオゲン株式会社 製造</p>	高單位鈣質 改善土壤 控制氮肥 防止徒長
--------------	--	-------------------------------

——各種農業(園藝)肥料、藥品、器材總匯——

台灣總代理 總經理	<b>台和園藝企業股份有限公司</b>	郵政劃撥：101360
	台北市士林區中正路104巷1弄2號	電話：(02) 831-3302
	台中連絡處：台中市三民路一段164號	電話：(042) 223374