



患腫柄病的菇子實體(徐鴻舉)

農民多忽略此點，認為覆土不是採自菇舍周圍田地，添加石灰即算消毒處理。

推廣的覆土消毒分：

1. 福馬林50倍液混入土中，以塑膠布覆蓋，24小時後將土散開，

7天後藥味消失即可使用。

2. 每坪覆土使用85%「適隆」可濕性粉劑1000倍液與覆土均勻混合，覆蓋24小時後散開土壤，7~10天後藥味消失方可使用。

3. 覆土以氯化苦燻蒸，兼防線

蟲。

4. 覆土以70°C 蒸氣處理30分鐘，溫度下降後即可使用。

一般預防法在覆土後全面噴灑萬力、芬敵、巴斯丁、貝芬昔等系統性殺菌劑，每坪1克稀釋2000~3000倍。菇床有病菇時應先清除病菇及周圍覆土，再噴藥。發病嚴重時可增加藥量至每坪2克。菇舍害蟲應一併以推廣藥劑防除以減少其媒介病害。

褐斑病

褐斑病俗稱水傷，本省推廣洋菇栽培初期普遍發生，近年來由於栽培管理方法的改進及藥劑的使用，病害發生逐漸減少。

雖然本病的發生對產量無顯著影響，但因被害子實體品質低劣，原料檢收時特別選等外面拒收，菇農損失不少。

濃縮液體有機肥料

日本原裝進口

農林廳肥料登記農肥字第0149號
已列內銷檢驗第302014號



特奇液 タキイ

保證功效：

- ※ 促進發芽
- ※ 提高品質
- ※ 防止蟲害
- ※ 提早收成
- ※ 增加收量
- ※ 改善土質

獨特成分：

含氮、磷、鉀外，另有核酸、亞米諾酸、加里高級成分、完全有機質成分。

日本タキイ(TAKII)種苗株式會社 榮譽出品

總經銷：日九實業股份有限公司
台北市敦化南路390巷46號 金城大廈3樓之一
電話：7810131-2



徵求台東經銷商

說明書備索



豐產富 (プラントフッド)

農林廳肥料登記農肥字第0149號 已列內銷檢驗第302014號

- 特性：高成份、速効性，用粉、泡水兩用均可栽植。
- 適合作物：果樹、蔬菜、果菜、水稻、雜作、育苗等等作物均可。
- 詳細說明書：備索(來函請寄日九實業股份有限公司)
- 經銷商：誠徵各地區特約商
- 製造廠：日本關西日產化學株式會社 榮譽出品