

豬在飼養管理中，常發生豬羣互相咬尾的情形。台南下營鄉仁里村四健會養豬組在召開作業會議時提出研討，以下是他們提供防患的寶貴意見。

**陳萬得**（主席）：出生後20天左右的未離乳豬，買回後經過3~4天才會吃飼料。在這段期間，仔豬因想吃奶而相舐尾部，如此會造成咬尾的習性。

**許燈興**（書記）：我飼養30頭肉豬，分成2欄，每欄間隔一樣，1欄養18頭，另1欄養12頭（不同時期購入），結果18頭的那1欄咬尾情形較嚴重，依此看來，飼養太密可能是促使咬尾的原因之一。

**廖順秋**（副主席）：我發現被咬尾的豬，在同一豬欄內，較小的被咬的機會多，因此在同1欄內的豬，盡量放養大小一樣的較適合。

**顏寶林**（會員）：每天除了飼養及清潔豬舍外，盡量減少到豬舍走動或大聲叫喊，以免驚動豬羣而引起逗玩，因而發生咬尾現象。如有發現豬羣起逗玩，可以給牧草或其他東西，這樣可減少咬尾的行為。

**曾家佑**（會員）：豬咬尾除了外在因素外，還有身體營養因素，如缺乏維生素、蛋白質、礦物質，而礦物質以缺鐵較多，因此造成貧血。在豬逗玩而咬尾出血時，因血液有一種腥味，正好是貧血豬最喜歡聞

的味道，因此互相舐吸造成咬尾的情形，應在飼料中添加礦物質及維生素，同時在豬舍內放置清潔土。

**曾永木**（會員）：豬在咬尾而流血不止時，應將被咬的部位用碘酒消毒後結紮。為防止再被咬，可用鐵絲結紮後留一小段，由於留出的部份可能刺傷對方的口腔而使牠不敢再咬。

**姜萬全**（會員）：發現豬在無聊互相逗玩的時候，放一些舊的輪胎在豬舍讓牠們玩，可以減少咬尾。

**沈寶宗**（會員）：要放在豬舍內供豬羣咬玩的東西，我覺得用鐵鏈最好，豬在咬到鐵鏈後牙齒會痛，因此牠就不敢再去咬其他豬的尾部。

**陳銀利**（會員）：防止豬咬尾就要剪尾，在仔豬出生時，將尾部約3~4公分處用剪刀剪掉，然後以碘酒將傷口充份消毒，經過2~3天後傷口就會好。

**曾世賢**（會員）：，另一種剪尾的方法，就是將剛出生的仔豬，用細線將尾部3~4公分處縛緊，尾端會自然脫落，這是一種安全可靠又經濟的方法。

**陳錄星**（義務指導員）：各位所討論的事項都是確實的問題，因為豬咬尾不但會影響豬的情緒，又會減少食慾及發育不良，甚至導致發炎、膿毒敗血症或後軀麻痺、死亡等情形，致使養豬戶損失很大。

**台南** 區農改場從3月起，在各工作車裝置“農友服務箱”，本區農友凡看到本場工作車，可隨時向隨車技術人員提出農業上疑難問題，並登記所需農業推廣手冊以便郵送。（台南改良場）

**台中** 高級農校全體學生訂閱「豐年半月刊」，並以豐年內容為題材，定期舉辦農業新知測驗。68年度第1學期測驗，經評審績優同學及獎金如下：

- 第1名張耀銘獎金 1,000元。
  - 第2名林偉景，獎金 800元。
  - 第3名詹玉林及林煜安，各得獎金 700元。
  - 第4名黃夢麟，獎金 600元。
  - 第5名楊世明，獎金 500元。
- 以上獎學金由豐年社提供。

### 不任意種植台農62・67號水稻!!

「台農67號」和「台農62號」均屬高產、耐肥、抗倒伏的蓬萊稻品種，因在大量氮肥施用情況下，不發生倒伏現象，適於機械收割，所以很受農民歡迎。這兩個品種，目前在中部地區尚未列入正式推廣，但已在中部進行適應性試驗。等試驗有了結果，再邀集學者專家會商，決定是否可在中部地區正式推廣。希望目前農友切勿任意種植，因為糧食局可能不會收購。

目前在台中地區推廣的「台南5號」具有豐產、質優等特點，適合中部地區栽培，只是在栽培上需注意施肥管理，尤其不可施用過量氮肥。此外，在最高分蘗期後，應有適當的晒田，否則生育後期容易發生倒伏現象。台中改良場新選出的早熟蓬萊稻“轟早生”，可彌補“高雄選1號”穗上發芽的缺點，而且產量高、米質優良，適合中部地區的氣候環境。此品種初期生育較為緩慢，而且葉片較散開，這是它的特性，栽培時不可因為生育較緩而多施肥料，以致後期植株過高而倒伏。

「台南5號」和「轟早生」已正式列入推廣品種，有關栽培方法，台中改良場歡迎中部農友來信詢問。（台中區改良場）