

4號複合肥料為佳（含較高的磷、鉀肥，抑制營養生長）。

下圖為表示樹體的生育與施肥期的關係。另石灰石粉等鈣、鎂肥（校正土壤酸度）則在秋季撒施。


施肥方法

施肥方法視土壤管理不同稍有差別。草生栽培，基肥或追肥可全面撒施於樹冠外圍下，施用後，砍草或割草覆蓋在肥料上面即可，省時省工。若開溝施肥，可行環狀或條狀開溝於樹冠外圍下方，不可行放射狀開溝。施肥時，儘量避免傷根部。放射狀開溝施肥，傷根太多，反而不佳。開溝若傷及根部應加以修剪傷口。又追肥可在5、6月下雨後，或土壤稍潮濕時

撒施。

葉面施肥：尿素可在春夏葉面施用。噴射農藥時混合施用，最好在新梢生長期，土壤太旱，根部受傷無法吸收肥料時，尿素補充施用，春季濃度為0.2~0.3%（300~500倍），夏季為0.1~0.2%（500~1,000倍），秋季不必施用。為抑制秋季的營養生長，促進果實成熟或枝梢成熟，使花芽分化良好，在秋季可噴施第一磷酸鉀（工業級）300~500倍。

柑桔施肥是較複雜且不易表現結果的田間管理，故合理化的施肥及改良土壤的酸度是改進柑桔生產的重要措施，同時還需再配合良好的草生栽培，適度的灌水，以使肥效充分表現，增加生產，提高品質，降低生產成本。



圖：樹體的生育與施肥期的關係

據國外資料

效果：

- 形成被膜
- 預防苦痘病發生
- 促進果實鈣份吸收
- 減輕銹病發生
- 幼果期有害光線遮斷補助

適用作物：

蘋果、柿、柑橘、梨子

現貨：

梨山：永安農藥行 (045) 989350

大勝農藥行 (045) 989363

連裕農藥行 (045) 989361

東勢鎮：東豐農藥行 (045) 872437

傑成堂農藥行 (045) 872487

石岡鄉：德生堂農藥行 (045) 228676

卓蘭鎮：民豐農藥行 (045) 892138

益新農藥行 (045) 892361

埔里鎮：富光農藥行 (049) 982797

果實界面保護

生理障礙防止

久麗扶隆®
CLEF-NON

クレフノン

〈綜合微量元素〉

使用倍數：80~240倍

進口：

松洲化工公司

地址：豐原市豐勢路944號

電話：(045) 224792