

農業信箱



水田養泥鰱

目前盛行以水田養殖泥鰱。我有4厘田地，因面積小，種水稻很不方便，打算在二期水稻收割後，改種芋並兼養泥鰱。請問：

(1)給餌場、捕獲場及越冬場應如何設計？

(2)捕捉泥鰱的蝦籠何處可購得

(3)泥鰱如何鑑別雌雄？(苗栗縣竹南鎮港墘里12號蔡銘鎔)

(1)普通以水田養殖泥鰱給餌場、捕獲場及越冬場為同一場所，面積約為全部水田的十分之一，深度為池(田)底下50~70公分，應設在水流通便利的位置。

(2)蝦籠可向漁具行或向農漁民採購。

(3)泥鰱雌雄鑑別的方法以胸鰭的形狀為主，詳見本刊28卷15期第28頁(胡興華)

人心果

(1)人心果大量種植，有何利弊？

(2)那一種品種品質較佳？何處可購得苗木？

(3)苗木宜採播種、高壓或嫁接法繁殖？(高雄縣美濃鎮清興街36號宋柏元)

(1)栽培人心果管理簡單，成本低，但消費習慣不普遍，不耐貯藏，不能加工。多量種植時，恐銷路有問題。

(2)本省最佳的人心果品種叫「馬尼拉」。果實大，產量高，品質最好，在「彰化縣永靖鄉五福村種

苗園」有種苗出售。

(3)高壓繁殖的種苗，生長快，結果早、不會變種，本省繁殖的都是高壓苗。

嫁接所需砧木苗，生長很慢，且嫁接成活不易，所以不採用此種方法繁殖。(張振宙)

睡蓮栽培

(1)睡蓮(又稱Water Lily, Blue Lotus 或 White Lotus)可否以種子繁殖？

(2)如何栽培？花的顏色共有幾種？(南投縣埔里鎮中正三路16號陳永亨)

(1)睡蓮沒有種子，一般用分割地下莖法繁殖。

(2)把地下莖埋在直徑1.2~1.5台尺的大花盆土壤中，土壤中再埋豆餅粉供做有機肥，然後把花盆放置在水中，花盆面與水面相距1台尺左右為宜。

花色有紫、黃、白、紫紅、桃色等，為池塘內常見的觀賞植物。(黃敏展)

蜆養殖

(1)蜆要如何選苗及飼養管理，才会有良好產量？

(2)我養的蜆為何會變黑？

(3)蜆可否與魚一起混養？

(4)飼養草魚，每日攝草量若干？(花蓮縣吉安鄉化仁26~3號陳建龍)

(1)必須選購黃色蜆苗，作清水養殖，才会有良好產量。池水過肥，會因缺氧而整死。過搭會發生藻類，影響成長。

(2)池底受到污染，所飼養的蜆

會變黑。

(3)可混養草魚，草魚亦屬清水養殖魚類。

(4)草魚攝草量依水溫而異，約為魚體重的 $\frac{1}{2}$ 。(余廷基)

鵝拗翅

白羅曼鵝為何會有拗翅，即翅膀左右伸直，不能併合身上的現象？(台南縣下營鄉新興村567~20號姜昭雄)

鵝翅羽及尾羽的毛管多汁，當翅膀開始長羽時，羽毛未成熟，富含血液及體液，如管理不當易發生拗翅，影響出售時的評價。

引起拗翅的主要原因為：

(1)飼養密度過高，相互啄食，剛長出的翅羽被啄損，而長不好。

(2)粉狀飼料掉落在鵝背部，又因鵝羣過度擁擠，沒有水浴，相互啄食，翅羽被啄損。

(3)放牧場地排水不良，使翅羽沾滿泥漿或糞糞，如沒馬上洗淨，也會發生相互啄毛，導致翅膀下垂或左右伸直不能併合身上。

避免密飼，放牧地保持乾淨，採用粒狀飼料，發現啄傷時立即擦碘酒，可預防拗翅的發生。(唐清苓)

