

(續上期)

# 白火雞

講授：唐清苓

筆記：王二郎

**火雞黑頭病：**對火雞的危害比雞嚴重，死亡率高達 50~100%，以火雞中雞階段 2~4 月齡時最易發生。

因發燒、血液循環障礙，少數病雞頭部會發生暗黑色，所以有黑頭病之稱，但是並非所有病雞頭部都會變黑。

黑頭病的病原體是鞭毛虫類的原虫病原體，藉中間宿主盲腸虫的媒介，才會感染。

最好的預防方法是於 6 周齡及 25 周齡時定期驅虫，因 2~4 月齡最易發生，發生前驅虫最有效。

由於藥劑對公火雞造精及母火雞產蛋能力有衰減的影響，所以種火雞於 25 周齡即驅虫，以免患病後難以控制。患過病的種火雞，要淘汰。

驅虫藥可用硫二苯鈹 (Phenothiazine) 或芬

維斯 (Phenovis) 每公斤體重給予 0.5 公克；或泛能克 (Panacur) 4%；每噸飼料添加 1.2 公斤。1 天投藥或平分為 6 天連續投藥。

病雞的治療，可用 0.1~0.2% 泰滅淨鈉 (Daimeton soda) 粉末泡飲 3 天，或肌肉注射維他命 B 0.5~0.8cc/kg (公斤) 及赤痢星或趨痢王 0.3~0.4cc/kg 連續 3 天，就可控制蔓延。

## 飼養管理

因目前尚無火雞專用飼料，我們可用雞用飼料代替。小火雞出生至 8 周齡為小雞階段，使用高熱能小雞飼料；9~16 周齡使用中雞飼料；17~30 周齡使用大雞飼料；31 周齡以後，使用種雞飼料。

早晚各喂一餐飼料，中午給予青飼料，青飼料可

## 豐年姊妹刊物

# 農業周刊 Agri-week

農業是生活的基楚

農業周刊充實你的生活

報導農情 ● 推動農建

內容豐富 ● 訂費低廉

促進消費 ● 刺激生產

時效迅速 ● 發行最廣

全年 52 期訂費 210 元

本刊長期訂戶  
訂閱農業周刊  
可享優待！

您只要付 190 元，就可  
收到全年份！

請即匯款 · 勿失良機

(劃撥訂閱時，請註明  
豐年訂戶編號)

## 豐年社

台北市溫州街 14 號 · 郵政劃撥 5930 號