

還是自己。預先注意防範，較事後施藥，更為有助，茲舉防治象鼻虫一例以供參考：

象鼻虫的防治，可用大福松、毒絲本或好年冬（加保扶）粒劑中的任何一種，每植株用30公克，植穴內施15公克，植後覆土，再將15公克施於新植蔗苗周圍20公分土面。這種預防法，可避免補植，因為受害後補植，所補植蔗株勢將延緩產期，後期蔗價必然較低，以受損一成計，每公頃可能損失1萬元以上的收益。

為便利蔗農明瞭應否防治，以達經濟目的，特介紹預測方法：在每年3月初，全園香蕉尚未大量採收時，可在田間設置假莖陷阱，每分地設4個。陷阱為新鮮假莖，長45~60公分，對中央割開，割面向下，置蔗株旁，各陷阱距離，不得少於4株間隔。2天後翻開檢查，誘得虫數，平均每一陷阱超過2隻

時，應於種植時施藥防治，如未超過2隻可不必施藥，以節省支出。

至於其他田間管理，如防風支柱、灌溉與排水、除芽、割葉清園、摘心、疏果、套袋……等等，仍應按一般慣行方法進行。

集團經營與契作

除上舉各點格培改進措施外，有關機關如能配合辦理集團經營與切實推行契作，則香蕉產業，仍大有可為。

集團經營，配合機械耕作，可降低生產成本，品質也可達到畫一，但應如何集團經營，尚須進一步檢討，蓋訂合理可行的辦法。

推行契作，應仿照台糖公司推廣甘蔗辦法簽訂契約，計畫產銷。

訂約蔗園，必須注意種植時期，以4月中旬至5月下旬種植為準，可望翌年3月至6月間採收，正



誘象鼻虫陷阱

好配合日本市場。如任意提早或延緩種植，不但不能適合外銷，且影響蔗價，吃虧的仍是蔗農自己，希農友們多加考慮。

允好[®]乳劑

農藥許可證：經進字第0284號

最新最理想殺菌劑：效果大·無藥害·毒性低

- 防治病害：
- ① 水果、蔬菜：露菌病、白粉病
 - ② 水稻：稻熱病
 - ③ 其他細菌性疫病

美國 CITIES SERVICE COMPANY 出品

台灣總代理：嘉寶有限公司

台北市郵政信箱3339號

台灣總經銷：久安股份有限公司

電話：(049)225657