

## 李砧木

**問** (1)李多用桃砧或李實生苗做爲砧木，如用梅接上李，產量、品質、壽命是否會有不良影響？

(2)李有自花不結實的習性，應如何混植，才可獲致豐產？(台中縣和平鄉豐山粘粘農場林和昌)

**答** (1)凡表土深厚而肥沃時，宜採用李爲砧，於乾燥地宜用桃砧。梅與李的親和力雖很強，但是梅的根生長細弱，作爲李的砧木時有砧負現象發生，即砧木樹幹較細小，接穗樹幹較粗大。

梅接李在產量、品質、壽命沒有絕對性的影響，視土壤條件，栽培習慣而異。如本省、宜蘭、苗栗一帶多用桃爲砧木，台中、彰化地區多用梅作砧木，而歐美各國多用櫻桃、李、桃、及杏仁樹爲砧木

(2)只要選開花期一致者，皆可當做授粉品種用，混植比例爲1：9左右。(歐錫坤)

## 淡水魚混養

**問** (1)草魚每日的飼草量如何計算？

(2)單養草魚或鯉魚時，每甲地可放多少魚苗？草魚、鯉魚、吳郭魚、鱧魚等混養時，應各放多少魚苗？

(3)可否利用雞糞、雞糞、豬糞爲飼料來養魚？

(4)草魚、鯉魚、鱧魚池，池水宜爲變合水？

(5)10月放養魚苗是否恰當？(

屏東縣高樹鄉新南村興店路20~30號黃福二)

**答** (1)每日投飼乾草量應爲魚體重的3~5%。

(2)須視池塘條件而定，草魚每公頃約放6,000~9,000尾，鯉魚12,000尾。但須陸續捕售，藉以降低養殖密度。更重要的是草魚池須防止過肥，否則成活率不高。

草魚屬於清水養殖，吳郭魚、鱧魚屬於肥水養殖，鯉魚也不能過肥，混養比例須視池塘狀況而定。大致上草魚不適於和吳郭魚混養。

(3)所列糞肥均可使用養魚，只要適當控制施肥量，維持透明度在25公分。

(4)以3~6台尺爲宜。

(5)一般須在清池消毒後放養。如在10月清池，放養魚苗亦無不可，但吳郭魚須注意防寒設備。(余廷基)

## 香菇栽培期

**問** (1)可否在平地蓮霧樹下栽培香菇？

(2)香菇宜在何時栽培？

(3)菌種買回來應如何存放？何時接種？

(4)那些樹種可種香菇？砍下後放置多久才可入植？(宜蘭縣羅東鎮中山西路236~1號歸清木)

**答** (1)海拔較低地區栽培香菇應注意香菇品系及管理，初期最好先行小規模的試種。

(2)一般種植期爲11月至翌年2~3月，4月以後因雨季來臨及氣溫升高，不宜種植。

(3)菌種買回來應放置在陰涼、

不過分閉密潮濕，陽光不直接曝曬之處。

菌絲生長最旺盛之時，即在菌絲長滿菌種瓶而未老化(視化)或結球前種植。

(4)楓樹、柯樹、細葉皂杜、板栗……等均可栽培。段木以直徑12公分者爲標準，大小均可，但避免過大或過小。

一般硬質木材如板栗應在砍下後第7~10日左右入植，如爲楓樹、柯樹等軟質木材，因含水量較高，應在砍下後第15~20日入植，但仍應依木材的大小粗細而予以調節，通常以含水量在50%~60%之間最適宜種植。(廖英明)

## 蓮霧裂果

**問** (1)蓮霧果實爲何會裂開？如何防治？

(2)蓮霧應在何時整枝？(屏東縣新園鄉五房村福德路162號許萬財)

**答** (1)蓮霧裂果的主要原因有：  
①園地水分失調，太乾旱或乾後驟灌水。

②使用農藥不當如濃度太高，發生藥害。

防治法應對症下藥，即園地經常適量灌水以保持經常濕潤狀態，並正確使用農藥。

(2)蓮霧宜在定植後第1~2年整枝，即在離地面40~60公尺處留3~4枝主枝，然後放任生長而成自然圓頭型。

以後每年於採收期結束，6~7月及9~10月間各修剪1次。將直立徒長枝、密生枝、枯枝及病虫害枝剪掉。(王德男)

