

德麗蘭、蝴蝶蘭那樣普遍，主要是氣候的關係。因為大型喜姆比蘭的原產地都在熱帶的高原，其氣溫雖在夏季也相當涼爽，夜溫較低，光照又強。所以喜姆比蘭的花芽分化雖然不受高溫的影響，照常在攝氏30多度的高溫下，乃能充分花芽分化。但當花穗開始伸長發育以後，則需要冷涼的氣候，才不受阻害。然本省平地，在9月的晚夏，日溫仍然超過30°C以上，所以已經花芽形成的小花穗會因高溫而枯死，無法開花。那些在春天開花的，有很多都是第1次的花芽枯死後在秋季氣溫降低時產生的第2次花芽的花朵，所以花期也慢些。可知喜姆比蘭的栽培，在本省受到氣候上的限制，能適合栽培開花的，地方不多，尤其在平地。

日本有些業者為了提高開花率，和提早開花，每年春季把植株搬運到高冷地，待花穗充分發育的秋季

，再運回平地開花。本省已有業者在進行高冷地栽培。

一般家庭栽培，都選擇含有中國蘭血統的小型或中型喜姆比蘭。這些雜交種雖然花朵不大，但因有中國蘭的血統，生長強健，較容易開花，適合在客廳以整盆欣賞。

從花店購買的喜姆比蘭，在欣賞期間宜放置涼爽通風的地方，花朵壽命才會長。又盆內所用的栽植材料，通常都用瓦片、小石、蛇木屑等材料，排水都良好，所以應每天澆水1次。花謝後，把老花莖剪除，改放置在可遮光30~50%而又通風的地方，僅能照到上午陽光的地方亦可，但避免下午強晒的地方，不必擋雨。肥料宜每月施1次少量的花寶1號肥料和腐肥，以利生長發育。當根羣長滿花盆後，宜在春季3、4月間或秋季10月間掘取，分株繁殖，並把栽植材料更新，以利發育開花。



喜姆比蘭 (張瑞卿)

美多農-A



富多農-B

農作物培養基營養素(人畜無害)

效果：

- ※促進萌芽、培養發育
- ※提高品質、增收產量
- ※促進生長、防止落花落果

適用作物：

- ※蔬菜、果樹、水稻、豆麥、菸草、茶葉、花草、育苗、雜作等等作物



◎現貨供應

◎說明書備索，技術指導

〈誠徵嘉義、台南經銷商〉

經濟部工證台建字第60809號

台灣功用企業有限公司

總公司：三重市自強路三段七巷十二號

TEL：(02)9812979

工廠：台中縣大肚鄉太平路三號

台中分公司：(042)286329