

非洲菊

■ 陳運造

艷麗多姿·花期又長

隨著插花日漸的普及，切花的需要量愈來愈大，大規模栽培切花用非洲菊，是一項極具發展前途的花卉事業。

非洲菊原產於南非洲熱帶草原，是宿根性菊科花卉，由於花形很像光芒四射的太陽，所以在台灣俗稱「太陽花」。

非洲菊的花色，以紅、金黃、橙、粉紅和朱黃等色為主，但由於很容易雜交，所以也有許多中間色的品種。花梗伸長直立，艷麗而多姿，且容易開花，花期又長。

非洲菊的栽培品種，依照花形可以分為單瓣和重瓣種。

一些先進國家如荷蘭，專門致力於切花用重瓣種的育成，據最近國外報導，他們已獲得相當滿意的成績。新種不僅色彩艷美，花梗長50~60公分，花徑達15公分左右，而且瓶插的時間也延長很多。

非洲菊性喜稍乾燥而陽光充足的環境，同時以種在表土深厚、中性或微酸性、排水良好的砂質壤土上，生育較好開花也很多。由於是多年生的宿根花卉，且生育期間需肥較多，所以在種植以前，栽培地應先施放大量堆肥，並施用適量的過磷酸鈣、草木灰或苦土石灰後，作成100公分寬，15公分高的畦床，才能使其正常發育。

古老的品種，通常在每年3~4月或9~10月（以後者最適宜）

分株繁殖。新的品種多數改用種子，在2月間播種繁殖。通常用木箱，盛裝細蛇木屑，把種子的絨毛朝上點播在蛇木屑中，或者撒播以後再覆上薄薄一層蛇木屑也可以，然後再用細孔噴壺澆水，大約4~5天後即開始發芽。發芽後20~30天，先移植到3寸盆或塑膠袋中假植，到木葉長出6~7枚時，也就是發芽後60~70天，即可定植在上述的高畦上，以30×30公分的株行距，每畦種兩行。

除了種植前施用大量的基肥外，在生長期中，可視生育情形，每隔1~2個月追施混合肥料1次，

大約在播種後150~160天左右即可抽苔開花。初開的花品質稍差，要到第3次以後才漸趨正常。

為避免地下根糾纏一起，影響新根發育，及造成排水不良，使肉質貯藏根遭致腐爛，每年應把老植株挖起重行分株，去老根枯葉後再行種植。同時，應避免排水通風不良和連作，以免發生菌核病、白絹病和細菌性穿孔病等病害。

在寒冷而乾燥的冬天，非洲菊也容易發生白粉病，除了噴佈「可利生」1000倍稀釋液防治外，設法（如噴水等）提高空中的濕氣，也可避免發生。

由於初開的非洲菊，仍具有晝開夜合的習性，所以切花的時間應在開花後的第2天，花瓣正常伸展，而且花色完全顯現的時候。剪下的花朵，為保持良好的品質，通常用塑膠布套護並以橡皮圈固定後，每10~12朵包成一束，插在水桶中，或者基部用濕草紙包裹，外再用塑膠布包紮，以免失水。



非洲菊(林吉郎)