


種豬的飼養

• 高瑞娟 •



懷孕期的增重

一頭初產母豬在懷孕期間應增重36~50公斤，來供給胎兒及自身所需。經產母豬因不需要再生長，只要維持牠本身體重即可，因此所需要的增重較少，大約27~36公斤。這些增重已足夠補償母豬在分娩及哺乳時的失重，並使母豬在離乳時的體重與在配種時的體重相近。若仔豬提早離乳這些增重量可以減少些。通常，泌乳能力越好的母豬，也是體重損失最多的。

懷孕期間的增重因母豬本身身體狀況而不同。所使用的飼料種類，也影響增重的情形。

在懷孕期間，初產及經產母豬都必須獲得足夠的體重以應付哺乳時所需。在哺乳期的失重，因仔豬頭數，母豬本身狀況，飼料餵量的恰當與否，泌乳能力以及仔豬離乳的年齡而不同。

分娩前後的飼養

分娩前幾天所餵給的飼料量應減少，且要具有膨鬆及輕瀉性。如此可避免母豬便祕及減少母豬發熱的情形。麥麸是良好的輕瀉性飼料，約可代替一半的日糧。母豬分娩的當天，應絕食10~12小時，但必須供給充分的水。在寒冷的天氣裡應該保溫。母豬若有飢餓的現象，則可給予半公斤左右的飼料。

分娩第2天可給予1公斤左右的飼料，以後逐漸增加，至分娩後第5~7天增加至全量。此時期採用任食或限食均可。在分娩的第一周內飼料不可增加太快，否則會導致母豬生乳熱、乳房結塊，或者仔豬會因為吃得太多而有下痢的情形發生。

當母豬餵以全量飼料時，應觀察牠的乳房及仔豬的排便情形，以便了解飼料的增加是否太快。經過這段“吃得太多”的危險期後，母豬應餵以優良且完全平衡的飼料，來產生良好品質的母乳。在分娩期間並沒有任何一個良好的飼養計畫可以推薦，一個養豬業

者應該根據他自己飼養的結果，隨時調整及修正飼養計畫。

小麥麸及燕麥是良好的膨鬆、輕瀉性飼料，一些養豬業者利用甜菜渣、甜橘渣及亞麻子粉作為輕瀉性飼料。另有一些養豬業者，在分娩前後使用高劑量的抗生素，他們認為可以避免在分娩後的感染或併發症，其它飼料添加劑也被利用。

哺乳期的飼養

母豬在哺乳期所需的飼料較懷孕期為多，這是因為母豬生產母乳所需的營養分較製造胎兒時為多。據加州養豬學者對母豬產乳能力的調查資料顯示，在8個星期的哺乳期中，每一母豬產乳176.5~290公斤，平均為187公斤。而每日產乳量為1.5~5.3公斤，平均為3.1公斤。

母豬的泌乳能力有顯著的不同，是由於所餵給的飼料，遺傳的泌乳能力，每胎中仔豬的數目，母豬本身的情況及其它因素所影響。仔豬在離乳時的體力，健康情形及體重大部分因他們所能得到的乳量決定。因此，母豬必須餵以適當且充分的飼料來提供生產好品質的乳所必須的營養。

初產母豬在哺乳期間通常每日餵5公斤的飼料，經產母豬則餵5.5公斤。但這個採食標準可在每日3.6~6.8公斤之間變化。飼料的消耗量因仔豬的多少，母豬泌乳能力，仔豬體型大小，飼料的品質，母豬本身的健康狀況及其他因素而定。仔豬離乳的遲早亦影響母豬對飼料的攝取量。

假若母豬生產仔豬少，在6頭或6頭以下，則應限制飼料量。若為8頭或8頭以上的窩數，則可任由母豬採食，只要母豬不會變得太胖。如此可刺激母豬的產乳量。在一些飼料比較昂貴的地區，例如歐洲，他們依母豬的健康情形及哺育仔豬的數目，來採用限食的方法。在美國某些養豬戶亦採用此法，但不如其他國家那麼多。