

（六）管 理

1. **匍匐莖**：在高溫長日狀態下，植株會由葉腋長出匍匐莖，消耗養分，需要隨時摘除。一般愛利收種如定植期過早即有此現象發生，同時在5月份氣溫升高後，匍匐莖大量長出，此時尚有採收期，若不及時摘掉，產量將會降低。春香品種方面，高冷地培育的種苗，定植成活後，匍匐莖即大量長出，到12月以後才逐漸減少，應隨時摘掉，否則影響植株的生育旺盛及早期果實的大小，進而影響全期總產量；採收盛期的3月下旬以後，匍匐莖又開始長出，時間比愛利收早約一個月，且發生數量比愛利收多。匍匐莖的摘除，在草莓栽培管理是不可疏忽且影響產量極大的一項工作。

2. **摘枯老病葉**：高溫和莖葉枯死率高，應及早摘除，以防由於通風不良而引起病害。

3. **疏花疏果**：花數多時，如任其着果，則果實小，因此，花梗細、花蕾發育不良者，應及早疏花疏果及摘除畸型果、罹病果。疏花疏果工作極為麻煩，一般農家無此多餘勞力去完成此項工作，有鑑於此，新竹改良場於今年起將進行利用荷爾蒙處理，探討其疏

花疏果的效果研究。

4. **覆蓋**：定植一個月後，植株已長至相當大小，可開始覆蓋稻草，以防雜草生長，保持土壤水分，調節地表溫度，且可保持果實乾淨不沾泥沙。

5. **除草**：此項工作極其繁重，全生育期中約須進行六次，一分地的支出約為6,000元左右，為一筆龐大的支出，在農村勞力缺乏的狀況下，省工栽培實為一急迫的問題，新竹場自68年起先進行不同覆蓋物處理研究，繼而再進行除草劑及覆蓋物的再利用等問題，以解決勞力缺乏，降低生產成本。

6. **鳥害**：早期生產的果實，極易遭受鳥噬食，可用舊日曆紙等逐果包住，待成熟時採收，將可避免鳥害。

7. **灌排水**：視土壤乾濕情形，約5~7日灌溉一次，雨後及時排水，以免根部生長受損。最近兩年在盛產期均遭受嚴重雨害，損失甚鉅，大湖地區農會本年接受農林廳經費補助，進行高架式塑膠布覆蓋，探討其防雨害效果及經濟價值。


8. **畸型果防止對策**：(1)可飼養蜜蜂，每分地兩箱，有助減少畸型果，並增加產量。

(2)開花期在高溫下，農藥稀釋濃度不能過高，以


大橋牌中耕機55VA型

設有中央低利專案貸款


- ▲本機附有掘溝裝置。
- ▲操作自如，輕易簡便。
- ▲適於掘溝、作畝、挖穴、除草、培土等作業。
- ▲適用果園、菜園、桑園、茶園及其他園藝工作。
- ▲農會或農民若有意觀摩示範表演，(如蘆筍園、菜園等)請直接聯絡本公司。



室內外
果樹園
開排水溝



果樹園
開溝施肥



大橋牌台灣總代理

竹下農機股份有限公司

台北市武昌街二段118-1號 電話：(02) 3313320·3312766

台中市東山路一段55號 電話：(042) 337137·330780

經銷商：

廣太行 苗栗鎮中正路1467號 Tel:321348

富益農機行 卓蘭鎮中正路109號 Tel:892217

維祥農機行 卓蘭鎮博愛路9號 Tel:892683

國光農機行 東勢鎮延平里本街53號 Tel:872545

聯成五金行 竹山鎮集山路630號 Tel:642924

吉三山農機行 白河鎮中山路135號 Tel:852808