

防產生畸型果。

## (七)採 收

草莓普通開花後30~40天就可採收(依照積算溫度計算,花芽形成到開花時需攝氏 105度,開花到果實成熟需攝氏 690度),氣溫低成熟慢,反之則快,鮮果用者宜在七~八分成熟時採收,加工用者完熟時採收,可提高加工品質。

## (八)病虫害防治

### 『採收期勿噴酒農藥』

1.灰色黴病:在濕度高,通風不良的環境下最易發生於葉柄、果實,呈灰色黴狀。可用巴斯丁 1,500 倍液或萬力1,500倍液防治。

2.葉斑病:春秋季較易發生,葉片呈紫紅色不鮮明病斑而逐漸擴大為圓形或橢圓形病斑,病斑周圍呈褐色,中央部份灰褐色,可用巴斯丁 1,500 倍液或萬力1,500倍液防治。

3.輪紋病:高溫時期病斑由葉緣發生,呈褐色同心圓狀,可用大生M—45粉劑400倍或萬力1,500倍液

防治。

4.葉芽線虫:罹病株葉片小、不整型而皺縮,芽數多,葉梗脆而易折斷,葉梗葉脉呈黑褐色,自定植成活後用甲基巴拉松 1,000倍液防治,每 7~10天一次,至開花時即停止施藥。

5.根腐線虫及根瘤線虫:前者植株根部變黑褐色,甚至皮層腐爛,中心柱變黃褐色;後者罹患植株根部有根瘤發生。兩者可用萬強 800 倍液防治,最好於苗圃時即徹底撲滅。

6.紅蜘蛛:在葉背發生,吸取汁液,葉片呈黃褐色無光澤,用賜滅多 1,000倍液,間隔 3 天,連續施用 3~4 次,即可完全撲滅。或用賽滅得粒劑每分地 2 公斤,整地時撒施於土壤中,兼可防治其他地下害虫。



三版新書

園藝家郁宗雄先生策劃修訂

# 專業栽培蔬菜30種

園藝家郁宗雄先生策劃修訂

69年 4 月出版, 24開本, 全書 200 餘頁, 專稿34篇分別由18位蔬菜專家撰稿, 內容增加青花菜、薺菜、莧菜、紫蘇、蘿蔔及黑皮波羅門參等, 圖版豐富, 封面彩色。

定價140元 郵購另加掛號郵資9元

豐年社

台北市溫州街14號 郵政劃撥5930號

