

即翌年2～3月播種。到了4～6月，苗有5、6片葉時，則應移至田間種植。

種植與管理

山葵的種植時期以秋季及春季最適宜。在日本，山葵種植在溪邊，所以應調節流水量，以防幼苗流失。日本的農民種植山葵之前，會用一種特製的鋤以除去因上次耕作所遺留的腐殖質，在台灣則無此種措施。

光度對山葵生長極為重要，光度過強之處應建築適當的蔭棚，而在光度不足處，應將蔽蔭木的枝樺部份伐除。

又山葵田中，上層木的枯枝落葉應予清除。

病蟲害防治

黑心病：日語軟腐病，本省

農友稱為黑心病。

黑心病是由一種寄生細菌所引起的疾病，誘發因子是氣溫過高。


防治黑心病最主要方法，是在行分株繁殖時，選用健康的分株苗。在黑心病嚴重的地區則應採用實生苗繁殖。並應注意遮蔽以調節氣溫。

葉萎縮症：葉萎縮症的病原菌大致可分為煙草萎縮病菌、刺瓜萎縮病菌等2種。病徵是葉萎縮而葉面有濃淡不一的黑斑。

防治方法，除選用健康幼苗外，在耕作地應防蟬螂。因蟬螂是上述病菌的帶菌體。

葉萎縮症是日本種植山葵的重要病害，據筆者所知，本省似尚未有此類病害，故應注意檢疫，以為預防。

毛虫：毛虫是蝴蝶幼虫，如為害嚴重時可用農藥防治。山葵如



與其他蔬菜混植時較易發生。

收穫與販賣

本省山葵多於冬季收穫。

山葵商品分兩種，生食用山葵及原料用山葵。生食用山葵即將山葵莖洗淨，修切整齊，然後裝箱出售。本省未患黑心病的山葵，幾乎均外銷日本作生食用山葵，目前代理商購買價格是每公斤新台幣450元。

原料用山葵是將不符生食用規格的山葵出售，以作山葵芥末的原料，目前每公斤售價40～50元，多供本省海產店的需要。

美多農-A



富多農-B

農作物培養基營養素(人畜無害)

效果：

- ※促進萌芽、培養發育
- ※提高品質、增收產量
- ※促進生長、防止落花落果

◎現貨供應

◎說明書備索，技術指導

〈誠徵嘉義、台南經銷商〉

經濟部工證台建字第60809號

適用作物：

- ※蔬菜、果樹、水稻、豆麥、菸草、茶葉、花草、育苗、雜作等等作物



台灣功用企業有限公司

總公司：三重市自強路三段七巷十二號

T E L：(02)9812979

工廠：台中縣大肚鄉太平路三號

台中分公司：(042)286329